

## מעקב רב שנתי אחר עצים שטופלו במג'יק במטע תמרים מזן מג'הול והשפעת יישום חוזר על עיכוב היתמרות ושיפור איכות פרי דו"ח מסכם 2011-2013

סריג פיני, אפרים ציפילביץ', סטרומזה אבי – מו"פ בקעת הירדן

אמנון הדר - אגריכם

### תקציר

לאחר סדרת ניסויים במיגוון תכשירים המוגדרים כמעכבי צימוח, הוכחה היתכנות לעיכוב היתמרות של עצי דקל. עיכוב גדילת התמרים התקבל הן בחוטרים שגדלו בעציצים והן בעצים הנטועים בקרקע במיגוון זנים. האטת גידול התמר לגובה הוא בעל חשיבות עליונה בהוזלת עלויות הגידול, ע"י ביטול או דחיית הצורך ברכישת כלי גובה יקרים ובשיפור בטיחות העובדים. מו"פ בקעת הירדן נירתם עם חברת אגריכם לגיבוש פרוטוקול ליישום מסחרי של תכשיר היוניקונזול (גימיק), שנימצא יעיל בעיכוב ההיתמרות, כולל הליך הרישוי לתכשיר. פיתוח הפרוטוקול מצוי בראשיתו, אולם כבר לאחר שלוש שנים של בדיקה, התברר כי נוסף לאפקט עיכוב הצימוח הושג שיפור של עד עשרים אחוז בגודל הפרי וגודל היבול כניגזרת מכך וכן פחיתה של כחמישה עשר אחוז ברמת השילפוח. מימצאים דרמטיים אלה, העבירו את מרכז הכובד של השימוש בתכשיר לכיוון שיפור כמות הפרי ואיכותו. תכשיר הגימיק נמצא בטוח בשימוש, ללא שאריות כלשהן בפרי וללא אפקטים שליליים על העץ. להשלמת פרוטוקול היישום נדרשת השלמה של פערי ידע בנושאי: מינונים, מועדי יישום אופטימליים, תדירות השימוש, גיל המטע לתחילת יישום וכן השפעות לטווח ארוך. נושאים אלו ניבדקים ע"י מו"פ בקעת הירדן.

### מבוא ותאור הבעיה

ענף התמרים הנו ענף המטעים הראשי בחשיבותו בבקעת הירדן. היקף השטח הנטוע בבקעה עומד כיום על כ- 20000 דונם והוא אזור הגידול הגדול ביותר בארץ ומהגדולים בעולם. הזן העיקרי הגדל בבקעת הירדן הינו המג'הול, המהווה כ- 90 אחוז מכלל העצים הנטועים. לפני כ- 10 שנים עסק ד"ר יובל כהן וצוותו בנושא עיכוב ההיתמרות בתמר. עיכוב ההיתמרות בתמר היא דרך מקורית וחדשנית להקלת התמודדות עם הצורך להשתמש בכלי גובה יקרים ומסוכנים כדי לטפל בנוף העץ ובפרי (3). הניסויים החלו בזריעים ובחוטרים בעציצים, הוכיחו היתכנות לעיכוב היתמרות בעזרת תכשירים מעכבי סינטזת גיברלין (6,7) ובהמשך נוסו על עצים הנטועים בקרקע (1). התכשירים יושמו במגוון שיטות הכוללות הגמעה לקרקע, הזרקה לקדחים בגזע והגמעת הכותרת ישירות לבסיס העלים. מגוון התכשירים שניבדקו במהלך השנים כללו תכשירים גנריים שונים של פקלובוטרוזול (5), ויוניקונזול וכן טרינאקסאפאט אתילי ופרוהקסאדיון. בניסויים השונים התבצעו מעקבים פנולוגיים וניבדקו היבטים וגטטיביים ורפרודוקטיביים שונים, בסמיכות ליישום התכשירים ולמשך מספר שנים לאחר הפסקת היישום, במטרה ללמוד על משך השפעות הלוואי (4). העבודה רחבת היקף והיסודית בוצעה במספר אתרים, התבצעה בזריעים (זריעי חיאני) ובזנים שונים (זגלול ומג'הול) (2). ניתוח הנתונים שנאספו והמסקנות שהוסקו הצדיקו פיתוח

פרוטוקול ליישום התכשיר במטע בניסוי בהיקף חצי מסחרי ובהמשך בכלל המטעים. התהליך המתואר מחייב בנוסף, רישוי של התכשיר. לרישוי תכשיר נירתמה חברת "תרסיס – אגריכס" עם תכשיר "גימיק" (יוניקונזול). בהמשך לניסוי ראשון שהועמד בנאות הכיכר (כיכר סדום), ביקש מו"פ בקעת הירדן, כמייצג של אזור הגידול הגדול בארץ של הזן מגיהול, לבדוק בתנאי בקעת הירדן, במטע של תחנת הנסיונות, הנטוע במיקום ובקרקע אופייניים למטעי הבקעה, את התכשיר גימיק בשני מועדי יישום ובשלושה מינונים. הניסוי שהחל לפני ארבע שנים, בוצע בקפידה יתרה תוך בחינת איכויות פרי. בשנים אלה נמצא בטיפולים המצטיינים עליה של 20% בגודל הפרי ופחיתה של כ- 10% בשילפוח. מימצאים מהפכניים אלה שינו את הדגש השימוש בחומר לשיפור איכות הפרי, כשעיכוב ההיתמרות מהווה ערך משני מוסף. בשנים אלה נבדקו ולא נימצאו שאריות תכשיר בפרי. התכשיר סיים הליך רישוי.

על בסיס מימצאי הניסוי הראשוני שארך 3 שנים והסתיים בשנת 2013, הוכנה תוכנית המשך הכוללת שני רכיבים:

א. מעקב רב שנתי (מינימום 3 שנים) אחר עצים שטופלו חד פעמית ביוניקונזול, ללימוד עקום דעיכה של השפעת התכשיר על קצב ההיתמרות ועל מדדי איכות וכמות של הפרי.

ב. ביישום מסחרי המתבקש לאור מימצאי הניסויים ההקדמיים, נידרש מענה לסוגיית תכיפות היישום של התכשיר והשפעותיו ארוכות הטווח. לביצוע הניסוי הוקצה שטח מטע גדול ובו ניבחנו תדירות היישום, החל מכל שנה וכלה באינטרוול של שלוש שנים. לאורך תקופה ארוכה (מינימום של 6 שנים), נערכים מעקבים וגטיביים ורפרודוקטיביים אחר העצים המטופלים.

#### מטרת המחקר:

מטרת המחקר היא פיתוח פרוטוקול יישום לתכשיר יוניקונזול (גימיק) לעיכוב היתמרות ושיפור איכות פרי התמר. לפיתוח שתי מטרות משנה:

א. מעקב רב שנתי אחר עצים בהם ייושם התכשיר חד פעמית.

ב. מעקב רב שנתי אחר עצים בהם מיושם התכשיר אחת לשנה. אחת לשנתיים או אחת לשלוש שנים.

### **חומרים ושיטות**

מטע – מטע תמרים מהזן מגיהול, של מו"פ בקעת הירדן. המטע ניטע בשנת 2007. המטע אחיד בהתפתחותו. המטע מושקה בשני מתזים לעץ. מרווח נטיעה 9 X 9 מ'.

תכשיר - על בסיס ניסויים קודמים, מתבצע הניסוי בתכשיר "גימיק" (יוניקונזול).

שיטת יישום – הגמעה ידנית של תמיסת גימיק (כמות מומסת ב 1 ליטר מים) בתחילת השקיה באזור ההרטבה של המתזים.

מועדי הגמעה – הגמעה סתווית ניתנה באופן חד פעמי בנובמבר 2010 לפני תקופת הצימוח הנמרץ. בהמשך כל הטיפולים בוצעו באביב, כשהפרי לאחר חנטה בקוטר 8 מ"מ.

מינונים נבדקים - 4 מינונים: 25, 50, 75, ו- 100 ג"ר תכשיר לעץ.

מרווח יישום – נבדק יישום אחת לשלוש שנים, שנתיים וכל שנה.

מבנה הניסוי – כל עץ הינו חזרה. בכל טיפול 4 חזרות. הטיפולים והחזרות פוזרו בשטח בין עצים אחידים, באקראי.

מדידות:

רישומים פנולוגיים להופעת ידות, פריחה. חנטה, בוחל וגדיד.

א. מדידת התארכות לולב - מדידת התארכות לולב בתחילת הניסוי בתאריך 8.11.12 ולאורך הניסוי, בתאריכים 14.12.11, 3.9.12, 9.10.12 ו- 9.11.12 נמדד גובה העצים מבסיס העץ ועד מקום פריצת הלולב העליון. בכל מועד חושב גובה עצים ממוצע והפרש הגובה בס"מ בהשוואה למועד בדיקה קודם.

ב. ספירת ידות - עם סיום הופעת ידות בוצעה ספירה ולאחר מכן בוצע דילול ידות בהתאם לגיל העץ. (בעונת 2011 הושארו בכל עץ שבע ידות. בעונת 2012 הושארו בכל עץ 10 ידות, בשנת 2013 הושארו 14 ידות).

ג. מיון - מיון כל הפרי בכל עץ בשלושת הגדידים, לגודל פרי ושילפוח. - במהלך ספטמבר אוקטובר 2011, 2012 ו- 2013 נקטף יבול מכל חזרה. מכל חזרה נדגמו בכל גדיד 100 פירות ונשקלו. לאחר הקטיפים חושב סה"כ היבול, חושב משקל פרי ממוצע משוקלל, ונקבע אחוז פרי משולפח.

ד. בדיקת שאריות – בדיקת פרי מהעצים שטופלו, בזמן גדיד, לשארית יוניקונוזול, במעבדות בקטוכס.

#### טבלה 1: פרוט טיפולים בשנת 2013

<u>ניסוי</u>	<u>טיפול מס</u>	<u>טיפול 1</u>	<u>שנה</u>	<u>תאריך</u>	<u>טיפול 2</u>	<u>שנה</u>	<u>תאריך</u>
א	1	היקש			היקש		
א	2	סמ"ק 25	2010	8.11.10	סמ"ק 25	2010	15.4.13
א	3	סמ"ק 50	2010	8.11.10	סמ"ק 50	2010	15.4.13
א	4	סמ"ק 75	2010	8.11.10	סמ"ק 75	2010	15.4.13
א	5	סמ"ק 50	2011	31.5.11	סמ"ק 50	2011	15.4.13
א	6	סמ"ק 75	2011	31.5.11	סמ"ק 75	2011	15.4.13
א	7	סמ"ק 100	2011	31.5.11	סמ"ק 50	2011	15.4.13
א	8	סמ"ק 100	2011	31.5.11	סמ"ק 75	2011	15.4.13
ב	9	היקש					
ב	10	סמ"ק 25	2012	17.4.12	ללא		
ב	11	סמ"ק 50	2012	17.4.12	ללא		
ב	12	סמ"ק 75	2012	17.4.12	ללא		
ב	13	סמ"ק 25	2012	17.4.12	סמ"ק 25	2013	15.4.13
ב	14	סמ"ק 50	2012	17.4.12	סמ"ק 50	2013	15.4.13

א. השפעות טיפולי הגמעה ב"מגייק" ע ל קצב צמיחת העצים :  
 בטבלה מס 2 מופיעים גבהי העצים שטופלו בתכשיר "גימיק" בטווח של עד שנתיים מתאריך היישום.

**טבלה מספר 2 : השפעת הטיפולים על גובה העצים**

גובה העצים בס"מ					יישום	הטיפול
6.11.12	9.10.12	3.9.12	14.12.11	8.11.10		
ב 223.8	ב 218.0	ב 203.0	ב 192.25	151.25	8.11.10	גימיק 25 סמ"ק/עץ
ב 220.0	ב 213.0	ב 199.0	אב 197.00	148.75	8.11.10	גימיק 50 סמ"ק/עץ
ב 213.8	ב 210.0	ב 195.0	אב 194.75	152.5	8.11.10	גימיק 75 סמ"ק/עץ
ב 221.3	ב 216.0	ב 202.0	אב 195.25	150.0	31.5.11	גימיק 50 סמ"ק/עץ
ב 221.3	ב 219.0	ב 199.0	אב 197.50	151.25	31.5.11	גימיק 75 סמ"ק/עץ
ב 222.5	ב 215.0	ב 203.0	אב 200.04	152.5	31.5.11	גימיק 100 סמ"ק/עץ
א 279.8	א 275.0	א 259.0	א 223.25	151.25		היקש

\*אותיות שונות בטור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 5%

בטבלה 3 מבוטאת השפעת העיכוב בהיתמרות בהפרשי גובה בין שני תאריכי מדידה, במהלך שנתיים (עד נובמבר 2012) לאחר יישום חד פעמי.

**טבלה מספר 3: השפעת הטיפולים על הפרש הגובה בהשוואה למועד בדיקה קודם**

הפרשי גובה בס"מ				יישום	הטיפול
9.10.12-6.11.12	3.9.12-9.10.12	3.9.12 – 14.12.11	14.12.11- 8.11.10		
5.8	15.0	ב 10.75	ב 41.0	8.11.10	גימיק 25 סמ"ק/עץ
7.0	14.0	ג 2.0	אב 48.25	8.11.10	גימיק 50 סמ"ק/עץ
3.8	15.0	ג 0.25	אב 42.25	8.11.10	גימיק 75 סמ"ק/עץ
5.3	14.0	בג 6.75	אב 45.25	31.5.11	גימיק 50 סמ"ק/עץ
2.3	20.0	ג 1.5	אב 46.25	31.5.11	גימיק 75 סמ"ק/עץ
7.5	12.0	ג 3.0	אב 51.5	31.5.11	גימיק 100 סמ"ק/עץ
4.8	16.0	א 35.75	א 72.0		היקש

\*אותיות שונות בטור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 5%

מנתוני טבלאות מספר 2 ו 3 ניתן לראות שלטיפולים הייתה השפעה דרמטית על צימוח העץ עד לתאריך 3.9.12. לאחר מכן השפעת התכשיר גימיק בכל הטיפולים שנבדקו נחלשה וקצב הצימוח בכל הטיפולים היה דומה. בטבלה 4 מתואר גובה העצים ותוספת הצימוח שנמדדו עד לתחילת 2014 ביישום חוזר של תכשיר ה"גימיק", במרווח של 1 – 2 שנים בין יישום אחד ליישום שני.

טבלה 4 – גובה עצים ותוספת צימוח בשנת 2013, בתגובה לטיפול חוזר במינונים שונים של תכשיר "גימיק"

טיפול 1	שנה	טיפול 2	שנה	30/07/2013	27/01/2014	תוספת צימוח (ס"מ)
				גובה עץ (ס"מ)	גובה עץ (ס"מ)	
		היקש		270	322.5	52.5
25 סמ"ק	2010	25 סמ"ק	2013	207.5	247.5	40
50 סמ"ק	2010	50 סמ"ק	2013	210	235	25
75 סמ"ק	2010	75 סמ"ק	2013	202.5	222.5	20
50 סמ"ק	2011	50 סמ"ק	2013	212.5	232.5	20
75 סמ"ק	2011	75 סמ"ק	2013	217.5	235	17.5
100 סמ"ק	2011	50 סמ"ק	2013	210	250	40
100 סמ"ק	2011	75 סמ"ק	2013	210	225	15
היקש				302	352	50
25 סמ"ק	2012	ללא		285	302.5	17.5
50 סמ"ק	2012	ללא		280	300	20
75 סמ"ק	2012	ללא		265	292	27
25 סמ"ק	2012	25 סמ"ק	2013	278	308	30
50 סמ"ק	2012	50 סמ"ק	2013	272	293	21

בטבלה 4 ניתן לראות כי בכל המינונים שיושמו הושג עיכוב בצימוח העץ. העיכוב נמשך לפחות שנתיים לאחר הטיפול. טיפול חוזר שימיר את עיכוב ההיתמרות, למעט טיפול שניתן ב 100 סמ"ק ב 2011 וב 50 סמ"ק ב- 2013.

מידת העיכוב בטיפולים השונים (למעט הטיפול הני"ל) פרופורציונית למינון של הטיפול הראשון.

**טבלה מספר 5 : השפעת הטיפולים על משקל הפרי, מספר פירות, ומשקל היבול בגיד 2011**

הטיפול (סמ"ק/עץ)	סה"כ יבול (ק"ג/עץ)	% מהיקש	משקל פרי (מוצע גר')	% מהיקש	מספר פירות מחושב לעץ	% מהיקש
8.11.10	46.8 א	123.7	26.8 א	121.8	1746.3	101.6
8.11.10	39.7 ב	104.9	26.9 א	122.3	1475.8	85.8
8.11.10	45.22 א	119.5	23.8 אב	108.2	1900	110.5
31.5.11	38.86 ב	102.7	21.3 ב	95.9	1824.4	106.1
31.5.11	47.0 א	124.2	22.3 ב	101.4	2107.6	122.6
31.5.11	39.9 ב	105.5	23.5 אב	106.8	1697.9	98.7
היקש	37.8 ב	100	22.00 ב	100	1719	100

\*אותיות שונות בטור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 5%

מנתוני טבלה מספר 5 עולה כי שני המינונים הנמוכים (25 ו- 50 סמ"ק לעץ) שניתנו כטיפול סתווי, השפיעו באופן מובהק על גודל הפרי. הטיפולים ב- 31.5.11 שניתנו לאחר חנטה ולאחר נשירת הפרי הטבעית לא השפיעו על גודל הפרי באותה עונה. משקל היבול לעץ הושפע ממועד יישום הטיפול וממספר הפירות הממוצע לעץ.

כטיפול גימיק בהגמעה, 25 סמ"ק בסתיו ו- 75 סמ"ק בתחילת הקיץ, התקבל יבול גבוה באופן מובהק משאר הטיפולים. סך כל היבול מותאם לגיל העצים (5).

**טבלה מספר 6 : השפעת הטיפולים על איכות הפרי גדיד 2011**

הטיפול	% שילפוח
גימיק 25 סמ"ק/עץ	34.24 ג
גימיק 50 סמ"ק/עץ	37.26 בג
גימיק 75 סמ"ק/עץ	50.67 א
גימיק 50 סמ"ק/עץ	50.11 א
גימיק 75 סמ"ק/עץ	44.48 ב
גימיק 100 סמ"ק/עץ	39.52 בג
היקש	53.29 א

\*אותיות שונות בטור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 5%

**טבלה מספר 7: השפעת הטיפולים על משקל הפרי, מספר פירות, ומשקל היבול בגדיד 2012**

הטיפול (סמ"ק/עץ)	סה"כ יבול* (ק"ג/עץ)	% מהיקש	משקל פרי ממוצע (גר')	% מהיקש	% פרי משולפח
גימיק 25	56.9	116.1	25.75 אב	117.0	40.5 ב
גימיק 50	56.2	114.7	26.5 אב	120.5	35.75 ב
גימיק 75	55.9	114.1	27.5 א	125.0	38.25 ב
גימיק 50	55.1	111.3	26.0 אב	118.2	39.0 ב
גימיק 75	62.9	127.0	26.75 אב	121.6	32.0 ב
גימיק 100	49.5	101.0	25.25 אב	114.8	42.0 אב
היקש	49.0	100	22.0 ב	100	58.75 א

\*אותיות שונות בטור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 5%

\* מחושב לפי משקל פרי חום ( ממשקל פרי צהוב הופחת 20% וממשקל פרי חצי צהוב הופחת 10%).

מתוצאות טבלה מספר 7 ניתן לראות בברור שהשפעת הטיפולים על כל מדדי היבול נמשכת שתי עונות. בשתי שנות הניסוי לא נמצאו שאריות כלשהן של התכשיר בפרי. השנה (2013) נמשך המעקב אחר השפעת היישום הבודד לאורך מספר שנים לאחר היישום, יישום עוקב של שנה לאחר שנה וכן יישום במרווח של שנה, על מדדי איכות הפרי.

**טבלה 8 – מדדים שונים של איכות פרי בגדיד 2013 בתגובה לטיפול חוזר במינונים שונים של תכשיר "גימיק"**

<u>טיפול 1</u>	<u>שנה</u>	<u>טיפול 2</u>	<u>שנה</u>	<u>יבול ממוצע (ק"ג לעץ)</u>	<u>משקל פרי (גר')</u>	<u>אחוזי שילפוח</u>
		היקש		51.3	16.38	50.8
25 סמ"ק	2010	25 סמ"ק	2013	74.8	22.00	47.2
50 סמ"ק	2010	50 סמ"ק	2013	85.2	19.17	35.6
75 סמ"ק	2010	75 סמ"ק	2013	81.1	18.53	46.3
50 סמ"ק	2011	50 סמ"ק	2013	71.2	17.19	38.0
75 סמ"ק	2011	75 סמ"ק	2013	84.9	21.8	49.1
100 סמ"ק	2011	50 סמ"ק	2013	60.8	22.6	38.9
100 סמ"ק	2011	75 סמ"ק	2013	80.7	20.25	37.3
היקש				74.2	17.54	52.2
25 סמ"ק	2012	ללא		100.5	17.85	35.2
50 סמ"ק	2012	ללא		105.1	22.35	37.9
75 סמ"ק	2012	ללא		81.8	22.38	35.8
25 סמ"ק	2012	25 סמ"ק	2013	121.1	19.66	40.3
50 סמ"ק	2012	50 סמ"ק	2013	116.0	22.45	47.0

בטבלה 8 המסכמת את גדיד 2013, ניתן לראות את ההשפעה המתמשכת, של תכשיר היוניקונזול על גובה היבול הממוצע לעץ, גודל הפרי הממוצע וכן על רמת השילפוח. בכל הטיפולים, התקבלה תוספת יבול בתגובה ליישום התכשיר. תוספת זו הושגה למרות מדיניות אחידה של דילול ידות, סנסנים ופירות על גבי כל סנסן. תוספת היבול בחלק מהטיפולים, חורגת מטווח התוספת שהיתה עשויה להיות מושגת כתוצאה מתוספת משקל ממוצעת לפרי הבודד. לתופעה זו אין בשלב זה הסבר, אך ייתכן שלתכשיר השפעה בהקטנת הנשירה הטבעית המתרחשת לאחר החנטה ובגמר הדילול. תוספת היבול שהושגה בכל הטיפולים קורלטיבית למינון ולתדירות היישום. בכל המינונים ובכל מרווחי היישום שניבדקו הושגה תוספת משקל לפרי כתוצאה מיישום התכשיר. מידת ההשפעה נמצאת במגמה לינארית למינון בו נעשה שימוש וכן למשך האינטרוול בין יישומים. ההשפעה על הקטנת השילפוח, שניצפתה בגדידים ב - 2011 ו 2012, חזרה על עצמה גם בגדיד 2013. ההקטנה במידת השילפוח הושגה בכל המינונים ובכל מירווחי היישום. גם בהשפעה זו נשמרת המגמה לפיה מינון גבוה יותר (בטווחים שניבדקו) מקטין את אחוזי השילפוח במידה רבה יותר. אין הלימה בין המירווח שנבדק לבין ההשפעה על הקטנת השילפוח.

לאחר שלוש שנות ניסוי ומעקב אחר יישום תכשיר גימיק לקרקע, במספר מינונים ובמגוון מירווחי יישום ניתן לסכם את הממצאים בתובנות הבאות:

- א. תכשיר היוניקונזול (גימיק), הביא כמצופה על בסיס הניסויים ההקדמיים, לעיכוב בגידול העץ. העיכוב הושג בכל מועדי היישום ובכל המינונים. אפקט עיכוב ההיתמרות נמשך לאורך שלוש שנים אך הוא דועך במהלך פרק זמן זה, עד לכדי הפסקת ההשפעה גם במינון הגבוה (75 סמ"ק לעץ).
- ב. השפעת התכשיר על הגדלת משקל היבול הגדלת משקל הפרי הממוצע, וההקטנה המובהקת של אחוז הפרי המשולפח, הינן בגדר תופעות לוואי המסיטות את מרכז הכובד של השימוש בתכשיר מעיכוב היתמרות לשיפור כמות ואיכות היבול.
- ג. גם ההשפעות על הגדלת משקל הפרי, הגדלת היבול והקטנת השילפוח, דועכות כתלות בזמן, וכמעט שנעלמות לאחר 3 שנים.
- ד. יישום חוזר של שנה לאחר שנה, משמר את כל האפקטים המושגים בשנה שלאחר היישום הבודד. לא ניצפו השפעות מצטברות ו/או אפקט מוגבר במדדים שניבדקו.
- ה. יישום באינטרוול של שנתיים, חידש את ההשפעות שדעכו והחזירו את ההשפעה הן על עיכוב ההיתמרות והן על גודל הפרי, משקל היבול והקטנת השילפוח.
- ו. בשלושת שנות הניסוי הושג באופן קבוע עיכוב היתמרות כתלות במינון שיושם וכן בטווח הזמן מהיישום ועד למדידת העיכוב.
- ז. השפעות על גודל הפרי והפחתת השילפוח הושגו באופן עיקבי מידי שנה. מידת ההשפעה שונה בשנים השונות. עונת 2013 התאפיינה בפרי קטן. תוספת הגודל בהשפעת התכשיר היתה פחותה מזו שהושגו בשנים קודמות.
- ח. בכל השנים, בכל המינונים ובכל מרווחי היישום, לא ניצפו נזקים לצימוח או לרפרודוקטיביות של העץ. עם זאת, יישום תכוף, אחת לשנה, נראה מיותר ועלול לחשוף את העצים לסיכון מיותר.

לצד מימצאים מבטיחים אלה, מתחייבת בדיקה ארוכת טווח להשפעות התכשיר על הצימוח ועל גובה היבול ואיכותו. כמו כן מתבקש גיבוש המלצות לתדירות השימוש, כיול מינונים וקביעת המועד האופטימלי ליישום התכשיר.



1. אלוני, ד.ד., פומרנץ, ר., חזון, ה., קרפ, ח., סנדלהם, ד., גלבוץ, א., כהן, י. (2009) עיכוב היתמרות של עצי תמר. עלון הנוטע, 63, 27-22.
2. אלוני, ד.ד., קרפ, ח., סנדלהם, ד., גלזר, ב., כהן, י. (2007) תמר: פיתוח מערכת לשליטה על היתמרות העץ לגובה. עלון הנוטע, 61, 639-634.
3. כהן, י., קורציינסקי, ר., סרוקר, ברנשטיין צ. (2004) 'התמר' הוצ' הדיקלאים בע"מ ומועצת הפירות.
4. כהן, י., אלוני, ד., קרפ, ח., קורציינסקי, ר., סנדלהם, ד., גלזר, ב., (2007) עיכוב היתמרות בתמר. דו"ח שנתי לתוכנית מחקר 203-0475-06
5. Carvajal E., Alvarado A., Sterling F., Rodriguez J., (1998) The use of paclobutrazol in oil palm clones during the nursery stage. ASD Oil Palm Papers, N18:29-33
6. Rademacher W., (2000) Growth retardants: effects on gibberellin biosynthesis and other metabolic pathways. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 51, 501-531.
7. Rademacher W., (2001) Chemical regulation of shoot growth in fruit trees. In : Extended abstracts of the 9th International Symposium of Plant Bioregulators in Fruit Production