

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא
אבקמול 500 מ"ג גרנולות בטעם תות-וניל
אבקמול 500 מ"ג גרנולות בטעם קפוצ'ינו

הרכב
 כל שקית מכילה:
 פראצטמול (Paracetamol) 500 מ"ג
 לרשימת החומרים הבדלי פעילים במכשיר ראה טעיף 6 – מימדי עוסף.

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה.
 עלון זה מכליל מידע מותאם למיני על התרופה. אם יש לך שאלות בנושא, פנה/י אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא. הגרנולות מיועדות למבוגרים וילדים מגיל 6 שנים ומעלה. עליון לטיפול התרופה בצורה כזוה. היעילות ברוקם אצל הילד זקוקה למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?
 התרופה מיועדת לשיכוך כאבים ולהורדת חום. קצובה תרופתית: אנלגטי ואנטיפירטי.
2. לפני השימוש בתרופה
 אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לפראצטמול או לאחד ממרכיביה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופה
 יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך סובלת או סבלת בעבר מ:
 • מחלת כבד או ליקויים בתיפקוד הכבד
 • אלתור
 • אלכוהוליזם
 • ליקויים בתפקוד הכליה

אזהרות
 • תרופה זו מכילה סורביטול וסוכרוז. אם ידוע לך שהינך רגיש לסוכרים מסוימים, עליון להיוועץ ברופא לפני נסילת התרופה, ראה פירוט בסעיף 6 בעלון זה.

התחשב/י במידע הבא
 • ניתן במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת.
 • כאשר בוסל הטיפול שותים משקאות אלכוהוליים.
 • כאשר נוסלים תרופות נוספות המשפיעות על פעולת הכבד.

• אין לטיל תרופות נוספות ולהורדת חום ושיכוך כאבים את תרופות להסגנתו של התרופה עם רופא או רוקח
 • יש להימנע מלקיחת מינון יתר/הרעה של פראצטמול. תרופה זו בזמן צום.

• אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי להיוועץ ברופא.

אם אתה/ה לוקחת/ת, או אם נטלת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון וויטמינים, כפרי זה, כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידיע את הרופא או הרוקח אם הינך נוטל/ת תרופה מהקבוצות הבאות או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה:

- תרופות נגד קרישת דם במיוחד וורפרין.
- תרופות הממריצות יצור אנזימים כבד (לדוגמה: ריפמפיצין, ריבוסטרין).
- תרופות לאפילפסיה – פניטואין, קרבמפוזין.
- תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים.
- סוכרולופרמיד או דומפרידון (לטיפול בחבלה, הקאה ובעיות עיכול נוספות).
- לורומפניקול (אנטיביוטיקה).
- פרובנצייד (לטיפול בשדגון).
- כולסטיראמיין (להפחתת יתר שומני הדם) עלול לגרום להפחתה בקפיטת הפראצטמול, ותוצאה מכך הוא עלול לגרום לירידה ביעילות של הפראצטמול. לפיכך, יש לקחתו בהפרש של שעה מלקיחת הפראצטמול.

שימוש בפראצטמול וצריכת אלכוהול
 בזמן הטיפול בפראצטמול אין לצרוך אלכוהול בגלל הגדלת הפוטנציאל לנזק לכבד.

הריון והנקה
 אם הינך בהריון או הרוקח אם אינך בטוח/ה.
שימוש בילדים
 תרופה זו מיועדת למבוגרים וילדים מגיל 6 שנים, ראה בפרק 3.

3. כיצד תשתמש/י בתרופה?
 עליון לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח/ה.

מינון מקובל בהעדוה הוראה אחרת מהרופא:
מבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה:
 1-2 שקיות של גרנולות 500 מ"ג ל-6 שעות לפי הצורך.
 אין לעבור על מינון של 8 שקיות ליממה (4 גרם פראצטמול).

ילדים בגיל 6-12 שנים:
 1-2 שקיות של גרנולות 500 מ"ג ל-4 שעות לפי הצורך.
 אין לעבור על מינון של 4 שקיות ליממה (2 גרם פראצטמול).
אין לעבור על המנה המומלצת.

עליון לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם התסמינים אינם חולפים תוך 5 ימים למרות השימוש בתרופה.

אופן השימוש
 אין לקחת עם מזון, יש לפתוח את שקית האבקמול, לרוקן את תוכנה בשיירות לתוך הפה, על הלשון ולבלוע. אין צורך במים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לאחד מינון של בית חולים והבטיח את אריות התרופה איתך. גם אם הרגשתך טובה, טיפול מימדי יהיה חיוני, בגלל הסיכון להתפתחות מזק חמור לכבד. תופעות לואו: יכולות להיות חבלה הוקמה, שלשול, אובדן תאבון, כאבי בטן, נפיחות, הועה מומברת, כאב או רגישות בבטן העליונה וייתכן שהן לא משקפות את חומרת הנזק לכבד.

אין לטיל תרופות בחושך! בודקו התווית והמנה בכל פעם שחינך נוטל תרופה. הרכב משפטיים אם הינך זקוק להם.

4. תופעות לואו
 לזמן לכל תרופה, השימוש באבקמול עלול לגרום לתופעות לואו כחלק מהמשתמשים. אל תביהלו/י למקרה שישמרת תופעות הלואו. ייתכן ולא תסבול/י מאף אחת מהן.
יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד:
 • אם תופעות תגובות אלרגיות חריפות כגון פריחה וגרד, התפחות של הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון אשר עלולים לגרום לקשיי נשימה או בליעה.

• אם מופיעים סימנים של שניונים במערכת הדם כגון: דימומים, בחבורות, התפתחות דלקות ביתר קלות.
אם אתה מתופעות הלואו מחמירה, או אם הינך סובלת/ת מתופעות לואו שלא הזכרנה בעלון, עליון להתייעץ עם הרופא מיד.

5. איך לאחסן את התרופה?
 מנע/י הרעה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים /או תימוקות ועל ידי כך למנע הרעה. אל גורמו/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date)
 המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן מתחת ל-25°C באריזה המוקיית, כדי להגן מאור ומלחות.

6. מידע נוסף
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
 Basic butylated methacrylate polymer, Sodium dodecyl sulfate, Stearic acid, Talc, Titanium dioxide, Simeticone, Hypromellose, Sorbitol, Sodium carmellose, Sucralose, Magnesium oxide filler, Magnesium stearate, N-2,3-Trimethyl-2-isopropylbutanamide.

כל שקית אבקמול 500 מ"ג גרנולות בטעם תות-וניל מכילה גם:

- Vanilla flavor, Strawberry flavor
- סוכרוז 0.14 מ"ג
- נתון 0.53-0.68 מ"ג
- סורביטול 801 מ"ג
- סוכרולוז 1.5 מ"ג

כל שקית אבקמול 500 מ"ג גרנולות בטעם קפוצ'ינו מכילה גם:

- Cappuchino flavor
- נתון 0.53-0.68 מ"ג
- סוכרולוז 801 מ"ג
- סוכרולוז 1.5 מ"ג

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
 אריזות אבקמול מכילות שקיות אלומיניום, כאשר בכל שקית גרנולות בצבע לבן או לבן-אוף-ווייט (off white).

יצרן:
 לזמן פרמה בע"מ, יוניבורג, גרמניה
בעל השיווק:
 סלומון, לוי ואלשטיין בע"מ, ת"ד 3696,
 פתח תקווה 49133

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות באוגוסט 2012.

מספר רישום התרופה בפקוס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
 148 33459 00 מ"ג גרנולות בטעם תות-וניל
 148 53 33459 00

אבקמול 500 מ"ג גרנולות בטעם קפוצ'ינו
 148 52 33449 00

לשם הפשוטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

אقرת וזראת הוטה לשה לשה ומוחואה
 פכשו ורזכו מן קבלה
 נוטה למסטה מוכג אנהמה الصبده
 (مستحضرات) ١٩٨٦-
 يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

أفكامول ٥٠٠ ملغ حببيات بطعم توت - قانيل
أفكامول ٥٠٠ ملغ حببيات بطعم كابوتشينو

التركيب
 كل كيس يحتوي على:
 پاراسيتامول (Paracetamol) ٥٠٠ ملغ
 لقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر أنظر الفقرة ٦ - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتضمن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا تفرقت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
يُعطي هذا الدواء بدون الحاجة لوصفة طبيب. الحبيبات مخصصة للكبار والأطفال من عمر ٦ سنوات وما فوق. عليك تناول الدواء على الشكل الصحيح. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

١. **لاي غرض مستحضر الدواء؟**
 الدواء مخصص لتسكين الآلام وتخفيض الحرارة.
الفصيلة العلاجية:
 مسكن وخافض للحرارة (Analgesic and antipyretic).

٢. **قبل استعمال الدواء**
لايجوز استعمال المستحضر إذا:

- لايجوز استعمال هذا الدواء إذا كنت على علم بحساسية للباراسيتامول أو لأحد مركباته.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء
 يجب استشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت تعاني أو إذا عانيت في الماضي من:

- مرض كبدي أو خلل في وظائف الكبد
- اليرقان
- الإدمان على الكحول
- خلل في وظائف الكلية

تحذيرات
 يحتوي هذا الدواء على سوربيتول وسكروز. إذا كنت على علم بانك حساس لسكريات معينة، فعليك استشارة الطبيب قبل تناول الدواء. أنظر التفاصيل في الفقرة ٦ من هذه النشرة.

• يحتوي المستحضر على پاراسيتامول الذي قد يسبب ضرراً في الكبد عندما:
 ○ يعطى جرعات أعلى من الموصى بها أو لفترة طويلة.
 ○ عندما يتم شرب المشروبات الكحولية خلال العلاج.
 ○ عند تناول أدوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.

• لايجوز تناول أدوية إضافية لتخفيض الحرارة وتسكين الآلام أو أدوية للزكام بدون استشارة طبيب أو صيدلي لمنع حدوث فرط الجرعة الدوائية/التسمم بالپاراسيتامول.

• يجب الابتعاد عن تناول جرعة دوائية عالية (ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.
 • لايجوز استعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة بدون استشارة الطبيب.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية تصرف بدون وصفة طبية وإضافات غذائية وفيتامينات، إكث الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأدوية التي تتناولها من المجموعات التالية أو إذا أنهيت الآن العلاج بدواء من:

- مضادات تخثر الدم خاصة وارفاغرين.
- أدوية تنشط إنتاج الأنزيمات في الكبد (مثلاً: ريفاميسين، باربيتورات).
- أدوية الصرع – فينيتوين، كاربامازيبين.
- مستحضرات مضادة للالتهاب الستيروئيدية.
- ميتوكلوراميد أو دومبيريدون (المعالجة الغثيان، التقيؤ ومشاكل هضمية أخرى).
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
- برونسديد (العلاج القرس).
- كوليستيرامين (لتخفيض فائض شحوم الدم) قد يسبب نقصاً في امتصاص الباراسيتامول. ونتيجة لذلك فهو قد يؤدي لنقصا في نجاعة الباراسيتامول. لذلك، يجب تناوله بفواصل ساعة من تناول الباراسيتامول.

استعمال الباراسيتامول واستهلاك الكحول
 لايجوز استهلاك الكحول أثناء العلاج بالپاراسيتامول بسبب زيادة الإمكانية للإحاق بالضرر بالكبد.

الحمل والإرضاع:
 إذا كنت حاملاً أو مرضعة يجب استشارة الطبيب قبل البدء باستعمال هذا الدواء.

الإستعمال عند الأطفال: هذا الدواء مخصص للكبار وللأطفال من عمر ٦ سنوات. أنظر الفقرة ٣.

٣. **كيفية استعمال الدواء؟**
 عليك الإستيحاء من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health and its content was checked and approved

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

This medicine is dispensed without a doctor's prescription

Avcamol 500 mg Strawberry-Vanilla Flavored Granules Avcamol 500 mg Cappuccino Flavored Granules

Content

Each sachet contains:
Paracetamol 500 mg

For a list of the inactive ingredients in the preparation, see section 6 - "FURTHER INFORMATION".

Read this leaflet carefully in its entirety before using this medicine. This leaflet contains concise information about the medicine. If you have further questions, refer to the doctor or pharmacist.

This medicine is dispensed without need for a doctor's prescription. The granules are intended for adults and children from 6 years of age and above. You must take the medicine in the correct manner. Consult the pharmacist if you need further information.

1. WHAT IS THE MEDICINE USED FOR?

The medicine is used to relieve pain and reduce fever.

Therapeutic group: Analgesic and antipyretic.

2. BEFORE USING THE MEDICINE

Do not use the preparation if:

- Do not use this medicine if you have a known sensitivity to paracetamol or to any of its ingredients.

Special warnings regarding use of the medicine

Consult the doctor before starting treatment if you are suffering, or have suffered in the past, from:

- Liver disease or impaired liver function
- Jaundice
- Alcoholism
- Impaired kidney function

Warnings

This medicine contains sorbitol and sucrose. If you know that you are sensitive to certain sugars, consult the doctor before taking the medicine, see details in section 6 of this leaflet.

The preparation contains paracetamol which may cause liver damage when:

- Given at a higher than recommended dosage or for a prolonged time.
- When drinking alcoholic beverages during the treatment period.
- When taking other medicines that affect liver function.
- Do not take other medicines to reduce fever and relieve pain, or cold medicines, without consulting a doctor or pharmacist, in order to prevent paracetamol overdose/toxicity.
- Avoid taking a high dosage (within the recommended limits) of this medicine when fasting.
- Do not use this medicine frequently without consulting a doctor.

If you are taking, or have recently taken, other medicines including non-prescription medicines and nutritional supplements and vitamins, tell the doctor or pharmacist. In particular, inform the doctor or pharmacist if you are taking, or have recently finished treatment with a medicine from the following groups:

- Anticoagulants, especially warfarin.
- Medicines that induce production of liver enzymes (e.g., rifampicin, barbiturates).
- Medicines for epilepsies - phenytoin, carbamazepine.
- Non-steroidal anti-inflammatory preparations.
- Metoclopramide or domperidone (for treatment of nausea, vomiting and other digestive problems).
- Chloramphenicol (antibiotic).
- Probenecid (for treatment of gout).
- Cholestyramine (to reduce hyperlipidemia) may cause reduced absorption of paracetamol and may consequently reduce the effectiveness of the paracetamol. It should therefore be taken with a lapse of one hour from taking paracetamol.

Use of paracetamol and consumption of alcohol

During treatment with paracetamol do not consume alcohol because of the increased potential for liver damage.

Pregnancy and breastfeeding

If you are pregnant or breastfeeding, consult the doctor before starting to use the medicine.

Use in children

This medicine is intended for adults and children from 6 years of age, see section 3.

3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?

Check with the doctor or pharmacist if you are uncertain.

Recommended dosage unless otherwise instructed by the doctor:

Adults and children 12 years of age and above:
1-2 sachets of 500 mg granules every 4-6 hours as needed. Do not exceed a dosage of 8 sachets per 24-hour day (4 grams paracetamol).

Children 6-12 years of age:

1 sachet of 500 mg granules every 4-6 hours as needed. Do not exceed a dosage of 4 sachets per 24-hour day (2 grams paracetamol).

Do not exceed the recommended dose.

Contact the doctor if the fever lasts more than 3 days or if the symptoms do not go away within 5 days despite use of the medicine.

Directions for use

Do not take with food. Open the Avcamol sachet, empty its contents directly into your mouth, onto your tongue, and swallow. There is no need for water.

If you took an overdose or if a child has accidentally swallowed the medicine, refer immediately to a doctor or proceed to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you. Even if you are feeling well, immediate care is vital because of the risk of developing severe liver damage. Side effects can be nausea and vomiting, diarrhea, loss of appetite, abdominal pain, bloating, increased sweating, pain or tenderness in the upper abdomen, and they may not reflect the severity of the liver damage.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take medicine. Wear glasses if you need them.

4. SIDE EFFECTS

As with any medicine, use of Avcamol may cause side effects in some users. Do not be alarmed when reading the list of side effects. You may not suffer from any of them.

Stop treatment and contact the doctor immediately:

- If acute allergic reactions occur, e.g., rash and itching, swelling of the face, lips, tongue, throat, which may cause difficulties breathing or swallowing.
- If signs of changes in the blood system appear, e.g., bleeding, bruising, developing infections more easily.

If one of the side effects worsens, or if you suffer from a side effect not mentioned in the leaflet, consult the doctor immediately.

5. HOW SHOULD THIS MEDICINE BE STORED?

Avoid poisoning! This medicine and any other medicine must be kept in a safe place out of the reach of children and/or infants in order to avoid poisoning. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by the doctor. Do not use the medicine after the expiry date appearing on the package. The expiry date refers to the last day of that month.

Store at a temperature below 25°C in the original package, to protect from light and moisture.

6. FURTHER INFORMATION

In addition to the active ingredient, the medicine also contains:

Basic butylated methacrylate polymer, Sodium dodecyl sulfate, Stearic acid, Talc, Titanium dioxide, Simeticone, Hypromellose, Sorbitol, Sodium carmellose, Sucralose, Magnesium oxide light, Magnesium stearate, N-2,3-Trimethyl-2-isopropylbutanamide.

Each sachet of Avcamol 500 mg Strawberry-Vanilla Flavored Granules also contains:

Vanilla flavor, Strawberry flavor
Sucrose 0.14 mg
Sodium 0.53-0.68 mg
Sorbitol 801 mg
Sucralose 1.5 mg

Each sachet of Avcamol 500 mg Cappuccino Flavored Granules also contains:

Cappuccino flavor
Sodium 0.53-0.68 mg
Sorbitol 801 mg
Sucralose 1.5 mg

How does the medicine look and what are the contents of the package:

The Avcamol packages contain aluminum sachets, each sachet containing white or white to off-white granules.

Manufacturer:

Losan Pharma GmbH, Neuenburg, Germany

License Holder:

Salomon, Levin and Elstein Ltd., P.O. Box 3696, Petah Tikva 49133

This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health in August 2012.

Registration number of the medicine in the National Drug Registry of the Ministry of Health:

Avcamol 500 mg Strawberry-Vanilla Flavored Granules : 148 53 33459 00

Avcamol 500 mg Cappuccino Flavored Granules: 148 52 33449 00

الجرعات الدوائية الاعتيادية في حال عدم وجود تعليمات

أخرى من الطبيب:
الكبار والأطفال من عمر ١٢ سنة وما فوق: ١ - ٢ أكياس من ٥٠٠ ملغ كل ٤ - ٦ ساعات حسب الوزن.
حبيبات تجاوز جرعة دوائية ذات ٨ أكياس في ٢٤ ساعة (٤ غرام) بإرستامول.

أطفال (بمصر) ٦ - ١٢ سنة: كيس واحد من حبيبات ٥٠٠ ملغ كل ٤ - ٦ ساعات حسب الوزن.
لا يجوز تجاوز جرعة دوائية ذات ٤ أكياس في ٢٤ ساعة (٢ غرام) بإرستامول.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.
عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت الحرارة لأكثر من ٣ أيام أو في حال عدم زوال الأعراض خلال ٥ أيام رغم استعمال الدواء.

إرشادات استعمال

لا يجوز تناول الدواء مع الطعام، يجب فتح كيس ألكامول، وتفرغ محتواه مباشرة لداخل الفم، على اللسان ومن ثم البلع. لا حاجة إلى الماء.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلغ مظهر من الدواء بالخطأ، يجب اتوجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضرت علبة الدواء معك. حتى ولو كان شعورك جيداً، فإن العلاج الفوري هو ضروري، بسبب الخطورة لتلفوت ضرر خطير للكبد. الأعراض الجانبية يمكن أن تكون: غثيان وتقيؤ، إسهال، فقدان الشهية للطعام، آلام بطنية، إنتفاخ، تعرق زائد، ألم أو حساسية في أعلى البطن ومن الجائز أنها لا تعكس شدة الضرر للكبد. لا يجوز تناول أدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعات الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

٤. الأعراض الجانبية
بعض لكل دواء، إن استعمال ألكامول قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أي منها.

يجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب حالاً:

- في حال ظهور ردود فعل تحسسية شديدة مثل طفح وحكة، إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، الحنجرة والتي قد تسبب صعوبات في التنفس أو في البلع.
- في حال ظهور علامات لتغيرات في جهاز الدم مثل: أنزفة، فرسوس، تطور التهابات بسهولة أكبر.

في حال تفاقم إحدى الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب حالاً.

٥. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسهم؛ يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات مبرصية من الطبيب. لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين دون ٢٥ درجة مئوية في العلبة الأصلية. للحماية من الضوء والرطوبة.

٦. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Basic butylated methacrylate polymer, Sodium dodecyl sulfate, Stearic acid, Talc, Titanium dioxide, Simeticone, Hypromellose, Sorbitol, Sodium carmellose, Sucralose, Magnesium oxide light, Magnesium stearate, N-2,3-Trimethyl-2-isopropylbutanamide.

كل كيس من ألكامول ٥٠٠ ملغ حبيبات بطعم فانيلا يحتوي أيضاً:
Vanilla flavor, Strawberry flavor

سكروز ٠,١٤ ملغ
صوديوم ٠,٥٣ - ٠,٦٨ ملغ
سوربيتول ٨٠١ ملغ
سكرالوز ١,٥ ملغ

كل كيس من ألكامول ٥٠٠ ملغ حبيبات بطعم كابوتشينو يحتوي أيضاً:
Cappuccino flavor

صوديوم ٠,٥٣ - ٠,٦٨ ملغ
سوربيتول ٨٠١ ملغ
سكرالوز ١,٥ ملغ

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العلبة:

تحتوي علب ألكامول على أكياس ألومنيوم، بحيث أنه بكل كيس توجد حبيبات بلون أبيض أو أبيض مائل للبيج (off white).

المنتج: لوسان فارما م.ض.، نوينبورج، ألمانيا.

صاحب الإمتياز: سالومون، ليفين وإلستين ل.د.م.ض.، بيتج ٣٦٩٦، بيتج - ٤٩١٣٣.

فحصت هذه النشرة وأقرت من قبل وزارة الصحة في آب ٢٠١٢.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي من وزارة الصحة: ١٤٨ ٥٣ ٣٣٤٥٩ ٠٠

ألكامول ٥٠٠ ملغ حبيبات بطعم كابوتشينو ١٤٨ ٥٢ ٣٣٤٤٩ ٠٠

ألكامول ٥٠٠ ملغ حبيبات بطعم فانيلا ١٤٨ ٥٣ ٣٣٤٥٩ ٠٠

من أجل ضمان وتوثيق وتأمين هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

AVCA STRA CAPP GRAN PL SH 181012