

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

יש לקרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה.

אלרג'יX טבליות

הרכב

כל טבליה מכילה:

Loratadine 10 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

Lactose monohydrate, pregelatinised starch, maize starch, magnesium stearate, purified water.
כל טבליה מכילה 62.5 מ"ג לקטוז מונוהידרט.

קבוצה תרפויטית

אנטיהיסטמינים מדור שני - נוגד רצפטור H₁.

התוויה

להקלה בתופעות אלרגיה: נזלת אלרגית, עונתית ושנתית והסימפטומים הנילוויים לה: התעטשות, עקצוץ ועיניים דומעות וכן לטיפול באלרגיה של העור.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון או מניקה.
אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד הלב, מערכת הנשימה (כגון אסטמה), הכבד או הכליה.

אזהרות

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לאלרגיה אצל אנשים הרגישים ללקטוז.
יש להפסיק נטילת התרופה לפחות 48 שעות לפני מבחן רגישות בעור מאחר ותוצאות הבדיקה עלולות להיות מושפעות ע"י התרופה (לבטל או להפחית תגובה חיובית למבחן).
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
לעיתים נדירות שימוש בתכשיר עלול לגרום לתחושת נמנום, שעלולה להשפיע על יכולת הנהיגה ושימוש במכונית.
יש לעדכן כל רופא (כולל רופא שיניים) המטפל בך שהינך נוטל אלרג'יX.
במידה ונכנסת להריון בעת נטילת התכשיר פני להיוועץ ברופאך.

תגובות בין-תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: יובש בפה, בחילה, נמנום, כאב ראש, עייפות או טשטוש ראייה, עצבנות, כאב בטן, עליה בתאבון.
אם תופעות אלו נמשכות או מטרידות, יש לפנות לרופא.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

יתכנו פעימות לב מהירות (נדיר): יש לפנות לרופא.
סימפטומים של פגיעה בכבד: עור ועיניים צהובים (נדיר מאוד) - במקרה זה יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד!
סימנים פתאומיים או חמורים של אלרגיה כגון פריחה עורית, גירוד, חרלת, התנפחות הפנים, השפתיים, הלשון או אזורים אחרים בגוף, קוצר נשימה, צפצופים או בעיות בנשימה: הפסק/י טיפול ופנה/י לרופא מיד!

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתיעץ עם הרופא מיד!

מינון

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:
מבוגרים וילדים מעל גיל 6 שנים: טבליה אחת פעם ביום. פועל תוך שעה עד 3 שעות ולמשך 24 שעות.
אין לעבור על המנה המומלצת.

במידה והתרופה אינה עוזרת להעלמות הסימפטומים, פנה/י לרופא. תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים מתחת לגיל 6 שנים. אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב, יש ליטול מנה מיד כשזכרת; אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד.

אופן השימוש

אין ללעוס או לכתוש! ניתן לחצות את הטבליה בקו החצייה. לבלוע הטבליה עם מעט מים. יש ליטול התרופה לפני ארוחה.

מנעי הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך. אל תגרור/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא! אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התוויית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

החסנה

יש לשמור את התרופה במקום יבש מתחת ל - 25°C. גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס. רישום התרופה: 124 58 30421 00

יצרן

טבע תעשיות פרמצבטיות חברה פרטית בע"מ, הונגריה

בעל הרישום

אביק בע"מ,
ת"ד 8077, נתניה.

משווק ע"י

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ,
ת"ד 3190, פתח תקוה.