

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידו

שם התכשיר: אבילאק סירופ

הרכב:

100 מ"ל מכילים: 66.7g Lactulose
חומרים בלתי פעילים: Lactose, Galactose, Purified water (לקטוז)

פעילות רפואית:

לטיפול בעצירות, במיוחד כרונית. התרופה משמשת גם לטיפול בטרומ-תרדמת כבדית ובתרדמת כבדית (אנצפלופתיה כבדית) רק לפי מרשם רופא.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש בתכשיר בחולים הסובלים מגלאקטוזמיה, חסימת מעיים כרונית, אי סבילות ללקטוז ובמצב של כאב בטן חזק.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:
אם הינך בהריון או מניקה.

אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכבד או שהינך נמצא/ת בדיאטה חסרת גלאקטוז.

אזהרות:

שימוש ממושך עלול לגרום לתלות בתכשירים משלשלים כגון זה.
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
אין ליטול תרופה זו עם חומרים משלשלים אחרים, במיוחד לא בהתחלת הטיפול.
במידה שאין שיפור במצב העצירות לאחר מספר ימים של טיפול עם אבילאק, יש להיוועץ ברופא.
המינון המשמש לטיפול בתרדמת כבדית הוא בדרך כלל גבוה, לפיכך יש להיזהר במתן לחולי סוכרת.
יש לבצע ניקוי מעיים יסודי לפני ביצוע בדיקה חשמלית בזמן פרוצדורה כגון פרוקטוסקופיה או קולונוסקופיה.
בתקופת הטיפול בתרופה זו בחולים קשישים ותשושים המקבלים אותה מעל 6 חודשים (התוויה - לטיפול בטרומ תרדמת ותרדמת כבדית), יש לערוך בדיקות אלקטרוליטים בדם.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד אם קיימת הוראה להשתמש בו-זמנית עם תרופות המורידות את ערך ה-pH במעי כגון מזלזין (אסקול). בטיפול בטרומ תרדמת ותרדמת כבדית שהינו טיפול ממושך במינון גבוה, יש לערוך בדיקות אלקטרוליטים בדם.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה, בפרט בימים הראשונים של הטיפול, עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: תפיחת המעיים בגזים ופליטתם, שיהוקים, כאבי בטן, שלשול. במקרה של שלשול יש להפחית את המינון.
תופעות אלה חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת הסתגלות לתכשיר.

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

במינונים גבוהים במיוחד בטיפול בטרום תרדמת ותרדמת כבדית, עלולים להופיע שלשולים. במקרה כזה המשך בטיפול ופנה לרופא, אשר יתאים לך את המינון עד להסדרת 2-3 יציאות ביום.
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה! ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

בהעדר הוראה אחרת מהרופא המינון המקובל הוא:
לטיפול בעצירות:

מנה יומית להמשך הטיפול	מנה התחלתית למשך 3 ימים	גיל
7.5-15 מ"ל פעמיים ביום	15 מ"ל פעמיים ביום	מבוגרים (כולל קשישים)
5-7.5 מ"ל פעמיים ביום 2.5-5 מ"ל פעמיים ביום 1.25-2.5 מ"ל פעמיים ביום	10 מ"ל פעמיים ביום 5 מ"ל פעמיים ביום 2.5 מ"ל פעמיים ביום	ילדים ותינוקות גילאים 5-10 שנים גילאים 1-5 שנים מתחת לגיל שנה

יתכן כי יעברו 48 שעות לפני שתורגש השפעת התרופה.
אם נגרם שלשול יש להפחית את המינון.

לטיפול בטרום תרדמת ותרדמת כבדית: חייב מרשם רופא!

מבוגרים (כולל קשישים): מנה התחלתית 30-50 מ"ל 3 פעמים ביום.

לאחר מכן יש להתאים את המינון עד להיווצרות 2-3 יציאות רכות ביום.

ילדים: אין מינון מומלץ להתוויה זו.

שים/י לב!

תרופה זו ניתנת לקחת עם מיץ פירות, מים או חלב.

אופן השימוש: ניתן ליטול אבילאק עם מזון כגון: פירות, יוגורט, דגנים וכו'.

לאריזה מצורפת כוסית מדידה.

כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול?

אם את/ה סובלת מעצירות, מומלץ לשתות הרבה נוזלים, לפחות 2 ליטר ביום (8 כוסות), שיעזרו בריכוך הצואה. השתדלי לאכול פירות וירקות לא מקולפים (כמו: פלפל ירוק, חסה, ברוקולי), שזיפים, לחם מחיטה מלאה, לחם שיפון. רצוי להימנע מאכילת טוסט, לחם לבן, אורז לבן. בגלל פעילותו המיוחדת של הלקטולוז, יכולות לעבור 48 שעות עד שתורגש השפעתו של התכשיר. בטרם תרדמת ותדמת כבדית ידרש טיפול ממושך על-מנת למנוע הישנות המחלה.

מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה.

אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים והבא/י אריזת התרופה איתך. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה:

במקום קריר מתחת ל- 25°C . לא להקפיא.

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 3175.25187

פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ, ירוחם.

27.11.05