

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ”ו-1986

קראי בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמשי בתרופה

קלוטרי

טבליות לנרתיק

הרכב

כל טבליה לנרתיק מכילה :
Clotrimazole 200 mg
מרכיבים בלתי פעילים :

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, crospovidone, calcium lactate pentahydrate, povidone, lactic acid, magnesium stearate, silicon dioxide.

כל טבליה וגינלית מכילה 612 מ”ג לקטוז.

קבוצה תרפויטית

נוגדי פטריות ממשפחת האזולים.

פעילות רפואית

תרופה אנטיפטרייטית רחבת טווח קוטלת פטריות וטריכומונאס (שוטוניות).

התוויה

התרופה מיועדת לטיפול בדלקת הנרתיק הנגרמת ע”י פטריות, המאופיינת ע”י גרד נרתיקי, עקצוצים, צריבה, המלווים לעיתים בהפרשה מוגברת.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה או לחומרים אנטיפטרייטים אחרים ממשפחת האזולים.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהריון או מניקה.

אזהרות

אם הינך רגישה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. התכשיר מכיל לקטוז העלול לגרום לאלרגיה אצל אנשים הרגישים למרכיבים אלה.

במידה שזו הפעם הראשונה שהינך סובלת מזיהום בנרתיק, התייעצי עם רופא. אם רופא איבחן אצלך בעבר זיהום פטרייתי

הינך סובלת מתופעות דומות, השתמשי בקלוטרי טבליות במשך 3 ימים.

במידה וסבלת מזיהום בנרתיק יותר מפעמיים במהלך 6 החודשים האחרונים עליך להתייעץ עם הרופא.

אין להשתמש בתרופה אם הינך סובלת מכאבי בטן תחתונה ומחוס.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 3 ימים, עליך להתייעץ עם רופא.

אם התופעות חוזרות תוך חודשיים מתום הטיפול, עליך להתייעץ עם רופא.

חזרת התופעות יכולה להיות קשורה למצב רפואי אחר (כגון סוכרת) או יתכן שאת בהריון - מצבים אלו מחייבים התייעצות עם רופא.

יש להמנע משימוש באמצעי מניעה (כגון קונדום או דיאפרגמה) שעשויים מלטקס (Latex) מאחר והתכשיר מכיל מרכיבים שומניים העלולים לפגום באמצעי מניעה אלו.

יש להיוועץ ברופא אם את או בן זוגך חולים או חליתם בעבר במחלות המועברות דרך יחסי מין.

יש להיוועץ ברופא אם יש צורך בטיפול תרופתי גם בבן הזוג.

יש להיוועץ ברופא לפני שימוש בתכשיר לשטיפת הנרתיק בין הטיפולים.

אם הינך בהריון אין להשתמש כלל בתכשיר לשטיפת הנרתיק.

אין להשתמש בתרופה בזמן הוסת או בעת דימום נרתיקי.

חולות מתחת לגיל 16 או מעל גיל 60 : יש להיוועץ ברופא לפני תחילת השימוש.

תגובות בין-תרופתיות

אם הינך נוטלת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

צריבה, גירוד או הפרשות וגינליות, בעור : גירוי, פריחה, שלפוחיות, אדמומיות או כאב שלא היו לפני הטיפול (נדיר) : הפסיקי הטיפול לפני הרופא.

תגובות אלרגיות : ירידה בלחץ הדם, קוצר נשימה, הפרעות במערכת העיכול, התעלפות, התנפחות השפתיים, הפנים או

הלשון, חרלת (פריחה מגרדת) : הפסיקי טיפול לפני הרופא .

בכל מקרה שבו הינך מרגישה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא

טבליה לנרתיק בערב לפני השינה במשך 3 ערבים רצופים. (ראי סעיף “אופן השימוש”)
אין לעבור על המנה המומלצת.


אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשזכרת ; אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד.

שימי לב

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש

יש להחזיר לנרתיק בעזרת המתקן המצורף (תמונה מס' 1), טבליה לנרתיק אחת בלבד, עמוק ככל האפשר לתוך הנרתיק. הדרך הטובה ביותר לבצע זאת היא בשכיבה על הגב עם הברכיים כפופות קצת פנימה לעבר הגוף (תמונה מס' 2). יש לשטוף היטב את מתקן ההחדרה לאחר כל שימוש.



* כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול? *

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע"י הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא. לבשי רק לבנים מכונתה והחליפי אותם לעיתים קרובות. יש להחליף גם גרביונים מדי יום. כדי למנוע הכתמה של הלבנים ניתן להשתמש במגן תחתון או בתחבושת הגיינית.

מנעי הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פני מיד לחדר מיון של בית חולים והביאי אריזת התרופה איתך.

אל תגרמי להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!
אין ליטול תרופות בחושך! בדקי התוית והמנה בכל פעם שהינך נוטלת תרופה. הרכבי משקפיים אם הינך זקוקה להם.

החסנה

לשמור תרופה זו במקום קריר. לא להקפיא. גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 127 41 30473 00.

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
ת"ד 3190, פתח-תקוה.