

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר.

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

קרא /י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

קולדקס®
קפליית/טבליית

הרכב:
כל קפלייה/טבלייה מכילה:

Paracetamol	300 mg
Chlorpheniramine maleate	2 mg
Phenylephrine hydrochloride	10 mg
Caffeine anhydrous	30 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

Lactose monohydrate, povidone, sodium starch glycolate, hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide, polyethylene glycol, quinoline yellow aluminium lake, iron oxide yellow, indigo carmine aluminium lake [FD&C blue no.2], colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, hydrogenated vegetable oil, Eudragit E 100.

כל קפלייה/טבלייה מכילה 26.5 מ"ג לקטוז ו-0.7 – 0.47 מ"ג נתרן.

קבוצה תרופוית

פרצטאמול-משכך כאבים ומוריד חום.
כלורפניראמין מלאט-נוגד היסטמינים.
פנילאפרין הידרוכלוריד-סימפאתומימיטי, נוגד גודש באף ובאוזניים.
קפאין - קסנטין אלקלואיד, מעורר את מערכת העצבים המרכזית.

פעילות רפואית

התרופה מיועדת להקלה בתופעות ההצטננות, גודש בסינוסים ונזלת אלרגית המלווים בחום ובכאבים.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך מניקה.
אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.
אין להשתמש בתרופה זו אם הינך נוטלת תרופות מקבוצת בולמי מונואמינאוקסידז (MAOI) לדיכאון, או בתוך 14 ימים מהפסקת הטיפול בהן.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהריון או אם הינך סובלת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד מערכת הנשימה (כגון אסטמה), הלב ו/או כלי דם או יתר לחץ דם, העיניים (כגון גלאוקומה), הכבד, אלכוהוליזם או מצהבת, הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול (כגון אולקוס), בלוטת התריס (פעילות יתר של התירוואיד), בלוטת הערמונית, מנטייה לאצירת שתן, מסכרת או מאפילפסיה. חולים קשישים עלולים להיות רגישים לתכשירים מונעי גודש.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך ?

השימוש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות. באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה. אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.

אזהרות

התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לאלרגיה אצל אנשים הרגישים ללקטוז.
התכשיר מכיל פרצטאמול העלול לגרום לנוק בכבד כאשר ניתן במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת, או כאשר בזמן הטיפול שותים משקאות אלכוהוליים או נוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד. אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח-למניעת מינון יתר/הרעלה של פרצטאמול.
יש להימנע מלקיחת מינון גבוה (בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום.
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי להיוועץ ברופא.
התרופה עלולה לשבש תוצאות מבחני אלרגיה ולכן יש להפסיק נטילתה 4 ימים לפני עריכת מבחנים אלה.
לפני כל ניתוח או עריכת בדיקות, יש להודיע לרופא על נטילת תרופה זו.

תגובות בין-תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, כולל תרופות ללא מרשם וצמחי מרפא, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: אספירין וסליצילטים, תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון תרופות להרגעה, נגד כאבים וחום, לשינה, פרקינסון, אפילפסיה), תרופות נגד שיעול והצטננות, תרופות נגד אסטמה, תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות, תרופות נוגדות דיכאון מסוג מעכבי מונואמינאוקסידאז או 14 יום לאחר הפסקת הטיפול בהן, נוגדי דיכאון טריציקליים, תרופות אנטיביוטיות מסוג אמינוגליקוזידים (כגון גנטמיצין), תרופות נגד קרישת דם (כגון וורפרין), מטוכלורפראמיד או דומפרידון (לטיפול בבחילה, הקאה ובעיות קיבה אחרות), כולסטיראמין (להפחתת יתר שומני הדם),

תכשירים הממריצים יצור אנזימים בכבד כגון ברביטורטים, פניטואין או קרבמזפין, תרופות נגד יתר לחץ דם (כגון חוסמי ביתא).

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון יובש בפה, עיניים ואף, נמנום, עצבנות, חוסר מנוחה או סחרחורת, עליה בלחץ הדם עם כאב ראש, שינויים בקצב הלב, תופעות אלרגיות (נדיר), טשטוש ראיה, קושי במתן שתן, נדודי שינה, בחילה, הקאות.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

שילשול, בחילה, כאב בטן (נדיר): הפסקי הטיפול ופנה/י לרופא.

תופעות אלרגיות (נדיר): קושי בנשימה, קושי בבליעה, נפיחות בשפתיים, לשון או פנים, גירוד (חרלת): הפסקי הטיפול ופנה/י לרופא.

הצהבת העור או עיניים, נטייה מוגברת לדימום וחבלות, עייפות חמורה (נדיר): הפסקי הטיפול ופנה/י לרופא. צמא או תיאבון מוגבר, סחרחורת, עילפון (נדיר): הפסקי הטיפול ופנה/י לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה.

מינון מקובל בהעדף הוראה אחרת מהרופא:

מבוגרים: 1 קפליה/טבליה כל 4 שעות (בהתאם לצורך).

ילדים מגיל 6-12 שנים: 1 קפליה/טבליה עד 3 פעמים ביום.

אם החום נמשך למעלה מ-3 ימים או אם לא היתה הקלה בכאבים תוך 5 ימים יש לפנות לרופא.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשזכרת, אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

שים לב!

אין ליטול תרופה זו עם כמות גדולה של משקאות המכילים קפאין כמו קפה, תה או קולה.

אופן השימוש

אין ללעוס, לכתוש או לחצות.

לבלוע את התרופה עם מעט מים.

יש ליטול את התרופה עם הארוחה.

מנעי הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים והבא/י אריזת התרופה

איתך.

אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכבי/ משקפיים אם הינך

זקוק/ה להם.

החסנה

יש לשמור את התרופה במקום חשוך מתחת ל-25°C.

גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של

התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה:

קפליות: 059 74 21484 00

טבליות: 069 84 28596 00

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ,

ת"ד 3190, פתח-תקוה.