

## עזרקאין קרם

### הרכב:

המרכיב הפעיל Lidocaine 5%

### מרכיבים בלתי פעילים

Emulsifying wax, cetyl alcohol, glycerin, methyl hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, water, lactic acid.

**קבוצה תרפויטית:** מאלחש מקומי מקבוצת האמידים.

### **פעילות רפואית:**

התרופה מיועדת לאלחוש מקומי ולהקלה מקומית של כאבים בעור וברירית, כגון בחתכים, שפשופים וטחורים וכן לפני טיפולים מקומיים בעור.

### **מתי אין להשתמש בתכשיר?**

אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביו, או לחומר אלחוש מקומי אחר מקבוצת האמידים.  
אין להשתמש על פצעים מוגלתיים, פצעים פתוחים, כוויות או על שטחי עור נרחבים. שימוש בתכשיר לעיתים קרובות, על שטחי עור נרחבים או למשך זמן ממושך, כולל לפני טיפולים קוסמטיים, עלול לגרום להופעת תופעות לוואי חמורות עקב ספיגת יתר. התופעות מפורטות להלן בסעיף תופעות לוואי.  
תרופה זו אינה מיועדת לשימוש בעיניים.

### **אין להשתמש בתכשיר מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול במקרים הבאים:**

אם הינך בהריון או מניקה. אם הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הכבד, הכליות, הלב ו/או כלי הדם, או אם הינך חולה גריאטרי.

### **אזהרות:**

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת מבלי להיוועץ ברופא. אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

### **תגובות בין תרופתיות:**

אם הינך נוטל תרופות נוספות, כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם ותוספי תזונה, או אם סיימת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות לטיפול במחלות לב / יתר לחץ דם, סימטידין, מאלחשים מקומיים אחרים.

### **תופעות לוואי:**

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי. אם תופעות הלוואי אינן חולפות או שהן מטרידות, יש להתייעץ עם הרופא.

### **תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:**

בהופיע גירוי, פריחה או דלקת מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר) (נדיר) - הפסק הטיפול ופנה לרופא מיד!  
סימני ספיגת יתר: הזעת יתר, עור חיזור, פעימות לב איטיות או לא סדירות, קשיי נשימה, שינויים בראיה או בשמיעה, בלבול, עוויתות, סחרחורות, תחושת חום, קור או נימול, רעידות, ערנות יתר, נמנום - הפסק הטיפול ופנה לרופא מיד!  
בשימוש לטחורים: אם לא חל שיפור תוך 7 ימים או אם חלה החמרה, יש לפנות לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד!

### **תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:**

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי ועל כל תרופה נוספת הניתנת לילד. ראה לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות שפורטו.

### **מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:**

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות מתחת לגיל שנתיים.  
 בילדים מגיל שנתיים ועד גיל 12: אין למרוח יותר מ- 0.1 גרם קרם על כל ק"ג משקל גוף (מריחה של בערך 3 ס"מ קרם על כל 10 ק"ג של משקל גוף), עד 3 פעמים ביום (כל 8 שעות).  
 במבוגרים וילדים מעל גיל 12: אין למרוח יותר מ- 5 גרם קרם (כ-15 ס"מ קרם) פעם בשש שעות. אין להשתמש ביותר משפופרת אחת ליום.  
 אין לעבור על המנה המומלצת.  
 לבעיות עור מתמידות, חמורות או נרחבות, יש להתייעץ עם רופא.

### **שים לב:**

לא לבליעה! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.  
 יש להימנע ממגע עם העיניים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף אותן היטב במים.

### **אופן השימוש:**

יש למרוח מקומית בשכבה דקה על האזור הנגוע, לפי הצורך. אין לחבוש או לחמם את המקום.

### **מנע הרעלה!**

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה.  
 אם בטעות אתה או ילד בלע/ת מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתך.  
**אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!**  
**אין ליטול או להשתמש בתרופות בחושך!** בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך משתמש בתרופה.  
 הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

**אחסנה:** יש לאחסן מתחת ל-25°C.

גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.  
 אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 163027791

מעבדות רפא בע"מ, ת.ד. 405, ירושלים 91003.

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו בנובמבר 2011.