

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

עזרקאין ג'ל

הרכב:

Lidocaine hydrochloride 2%

המרכיב הפעיל

מרכיבים בלתי פעילים

Benzalkonium chloride, glycerin, hydroxyethyl cellulose, propylene glycol, sodium hydroxide, water.

קבוצה תרפויטית: מאלחש מקומי מקבוצת האמידים.

פעילות רפואית:

התרופה מיועדת לאלחוש מקומי ולהקלה מקומית של כאבים בעור וברירית, כגון בחתכים, שפשופים, טחורים וכוויות קלות.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביו, או לחומר אלחוש מקומי מקבוצת האמידים. אין להשתמש על פצעים מוגלתיים או על שטחי עור נרחבים. שימוש בתכשיר לעיתים קרובות, על שטחי עור נרחבים או למשך זמן ממושך עלול לגרום להופעת תופעות לוואי עקב ספיגת יתר (התופעות מפורטות להלן בסעיף תופעות לוואי).

אין להשתמש בתכשיר מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול במקרים הבאים:

אם הינך בהריון, או מניקה.
אם הינך סובל או סבלת בעבר מאפילפסיה או מליקוי בתפקוד: הכבד, הכליות, הלב ו/או כלי הדם, או אם הינך חולה גריאטרי.

אזהרות:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת מבלי להיוועץ ברופא.
אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטל תרופות נוספות כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם ותוספי תזונה, או אם סיימת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות לטיפול במחלות לב/יתר לחץ דם, סימטידין, מאלחשים מקומיים אחרים.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי. אם תופעות הלוואי אינן חולפות או שהן מטרידות, יש להתייעץ עם הרופא.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:

בהופיע גירוי, פריחה או דלקת מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר) (נדיר) - הפסק הטיפול ופנה לרופא מיד!

סימני ספיגת יתר: הזעת יתר, הקאות, פעימות לב איטיות או לא סדירות, ירידה בלחץ דם, איבוד הכרה, קשיי נשימה, שינויים בראיה או בשמיעה, בלבול, עוויתות, סחרחורות, תחושת חום/קור או נימול, רעידות, נמנם - יש להפסיק השימוש ולפנות לרופא מיד!

בשימוש בטחורים: אם לא חל שיפור תוך 7 ימים או אם חלה החמרה יש לפנות לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד!

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12 שנים.
 במבוגרים וילדים מעל גיל 12: למרוח לפי הצורך.
 אין להשתמש ביותר משפופרת אחת ליום.
 אין לעבור על המנה המומלצת.
 לבעיות עור מתמידות, חמורות או נרחבות, יש להתייעץ עם רופא.

שים לב: לא לבליעה! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.
 יש-להימנע ממגע עם העיניים.

אופן השימוש:

לפתיחת השפופרת יש להבריג את החלק התחתון המשונן של המכסה השקוף. לאחר מכן יש להסיר את הטבעת הלבנה ולהבריג חזרה את המכסה השקוף עד הסוף. לקראת שימוש יש לשלוף את החלק העליון הדק במכסה השקוף. במקרה שהחומר לא יוצא מהשפופרת, יש להחזיר את המכסה הדק ולחזור על פעולת ההברגה יותר חזק.
 יש למרוח את הג'ל בעזרת אצבע נקייה, קיסם אוזניים או פיסת גזה. יש לשטוף את הידיים לאחר השימוש.
 הג'ל הינו סטרילי רק בשימוש הראשון לאחר פתיחת השפופרת.

מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
 אם בטעות אתה או ילד בלע/ת מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתך.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
אין להשתמש או ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך משתמש בתרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אחסנה:

יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
 ניתן להשתמש עד 6 חודשים מיום פתיחת השפופרת, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה המוטבע על-גבי האריזה. בשימוש סטרילי התכשיר מיועד לשימוש חד פעמי.
 גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד.
 נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברקוח שסיפק לך את התרופה.
 אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 192621043

מעבדות רפא בע"מ, ת.ד. 405, ירושלים, 91003

עלון לתכשיר בשיווק כללי.

לשם הפשטות והקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר, אך התרופה מיועדת לשני המינים.

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו בפברואר 2012.