

Norit Tablets

נוריט טבליות

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

נוריט טבליות

הרכב החומר הפעיל: פחם פעיל 125 charcoal activated מ"ג.

הרכב החומרים הבלתי פעילים: Sucrose, lactose, sodium CMC, magnesium stearate.

כל טבליה מכילה 92 מ"ג סוכרוז ו-92 מ"ג לקטוז.

פעילות רפואית: התרופה מיועדת לטיפול בהצטברות גזים במערכת העיכול וכעזר לטיפול בשלשול.

אין ליטול את תרופה זו עם חומר הגורם להקאה כגון סירופ איפקהקואנה.
אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

אזהרות: אם הנך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

אם קיימות תופעות נוספות במערכת העיכול כגון שלשול או כאבי בטן חזקים יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

הטבליות מכילות לקטוז וסוכרוז.

תגובות בין תרופתיות: אם הנך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.

במיוחד, לגבי תרופות מהקבוצה הבאה:

חומר הגורם להקאה: סירופ איפקהקואנה.

מזון מנוגד: חלב ומוצריו, גלידה.

תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון הקאות וצואה שחורה.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: במקרה של התנפחות הבטן יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא.

בכל מקרה שבו הנך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מקובל (בהעדר הוראה אחרת מרופא): לשלשול ולגזים – 4 טבליות אחרי ארוחה, ניתן לחזור על המנה הנ"ל אחרי שעתיים.

מינון לילדים: תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל שלוש שנים. במקרה של שלשולים, אם לא חל שיפור במצבך תוך יומיים יש לפנות לרופא.

שים לב: יש לחכות פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת תרופות אחרות.

אופן השימוש: אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם הרבה מים.
יש ליטול את התרופה אחרי הארוחה.

אחסנה: יש לאחסן בטמפרטורה של עד 25°C, לסגור היטב ולמנוע חדירת אוויר ורטיבות.
גם לפני תנאי האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה האריזה.

מס' רישום התרופה: 1203428424

היצרן: נוריט, אמרספורט – הולנד.

סוכן היצרן: אחים הירשברג ושות', ת.ד. 400, הרצליה.

היבואן: דרורת (י. מצקל) בע"מ, ת.ד. 593, תל אביב 61003

Norit Tablets

**Patient Leaflet According to the Pharmacists Regulations (Medical Preparations).
Please read the entire leaflet carefully before using your medication.**

Norit tablets

Active Ingredient: Charcoal activated 125mg.

Inactives Ingredients: Sucrose, Lactose, Sodium CMC, Magnesium Stearate.

Each tablet contains 92mg of Sucrose and 92mg of Lactose.

Therapeutic Activity: Anti Flatulent, and aid to treatment of diarrhea.

Warnings: If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before commencing treatment with this medicine.

If you suffer from other problems in the digestive system such as diarrhea or severe pains you should consult your doctor before taking the medicine.

Do not use this medicine with syrup ipecacuana.

Do not use this medicine if any sensitivity to one of the ingredients is known.

In case of abdominal swelling stop the treatment and attend your doctor.

Drug interactions: If you take another drug or you have just completed treatment of any other drug you should inform your doctor in order to prevent dangerous drug interactions or drug ineffectiveness. Especially: Syrup ipecacuana, or the following types of food: Milk and its products, Ice cream.

Attention: Allow a lapse of at least two hours between the taking of this medicine and taking of other oral medicines.

Tablets contain Lactose and Sucrose.

Side effects: In addition to the desired action of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking of this medicine. For example: Vomiting or black stools.

Recommended dosage (unless otherwise prescribed by your doctor): For gases and diarrhea 4 tablets after meal, can be repeated after two hours.

Children: This medicine is not regularly intended to children under the age of 3.

In case of diarrhea if there is improvement within two days please consult your doctor.

Directions for use: Do not chew! Swallow the medicine with water.

To be taken after meal.

Storage: Store below 25°C. This medicine should be closed securely to prevent entry of air and moisture.

Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine!

In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you. Do not store different medications in the same package.

Medicine registration number: 1203428424

Manufacturer: Norit, Amersfoort, Holland

Importer: Droreth Ltd (I. Matzkel), P.O.B 593, Tel Aviv 61003

Agent: Hirshberg Brothers and Co. Chemicals Ltd. Herzliya