

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו יוני 2006

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה:

שם התכשיר וצורתו: טיפטיפות נובימול תרחיף לבליעה

הרכב: החומר(ים) הפעיל(ים) וכמותם וריכוזם:

כל 1 מ"ל מכיל Paracetamol 100 mg

וכן כל:

Sorbitol Solution 70%, Glycerol, Sodium Cyclamate, Xanthan Gum, Strawberry Cream Flavour, Sodium Benzoate, Saccharin Sodium, Citric acid, Ponceau Water
כמות הנתרן בכל 1 מ"ל : 1.1 מ"ג

פעילות רפואית: משכך כאבים ומוריד חום

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

אם הינך בהריון או מניקה

אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הכבד, הכליה/מערכת השתן

אזהרות:

פראצטאמול עלול לגרום לנזק בכבד במקרים האלה כאשר: ניתן במינון גבוה מהמומלץ,

ניתן לתקופה ממושכת, שותים משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול, כשנטלים

תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת (יותר מ-3 ימים רצופים) בלי

להיוועץ ברופא.

אם הינך או ילדך/תך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך

לרופא לפני נטילת התרופה.

יש להיוועץ ברופא בעת שימוש בתרופה זו בילדים מתחת לגיל שלוש שנים.

יש להיוועץ ברופא אם ליטול תכשיר זה, או להשתמש בתכשיר אחר לשיכוך כאבים ו/או להורדת

חום.

אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים, או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם

רופא או רוקח – למניעת מינון יתר/הרעלה של פראצטאמול .

תגובות בין תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא

המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות. (X) במיוחד, לגבי

תרופות מהקבוצות הבאות:

תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות להרגעה, לשינה, פרקינסון,

אפילפסיה...).

תרופות נגד קרישת דם

תכשירים הממריצים יצור אנזימים בכבד כגון: ברביטורטים

תרופות אחרות נגד כאבים או חום ונגד דלקת פרקים

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: תופעות אלרגיות (גירויים בעור) המחייבות לפנות מיד לרופא.
תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: (הנובעות בד"כ ממינון יתר)
 שלשול, בחילה, כאב בטן (נדיר): הפסק הטיפול ופנה לרופא בכל מקרה שבו הנך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:**ילדים**

מצא/י את המינון המתאים בטבלאות המופיעות להלן.
אם ידוע לך משקל הילד – יש למצוא את המינון בטבלת המשקל המציינת מינון לפי משקל.
רק במקרה שלא ידוע משקל הילד – יקבע המינון על פי הגיל כפי שמופיע בטבלת הגיל המציינת מינון לפי גיל בלבד.

טבלת משקל

המינון לפי משקל הילד מחושב לפי 15 מ"ג/לק"ג משקל הילד, למנה, כלומר, 0.15 מ"ל לכל ק"ג משקל גוף של הילד.

מספר מנות מקסימלי ביממה	המינון הדרוש במ"ל	מ"ג	משקל הילד
עד 5 פעמים	0.45	45	3 ק"ג
עד 5 פעמים	0.60	60	4 ק"ג
עד 5 פעמים	0.75	75	5 ק"ג
עד 5 פעמים	0.90	90	6 ק"ג
עד 5 פעמים	1.05	105	7 ק"ג
עד 5 פעמים	1.20	120	8 ק"ג
עד 5 פעמים	1.35	135	9 ק"ג
עד 5 פעמים	1.50	150	10 ק"ג
עד 5 פעמים	1.65	165	11 ק"ג
עד 5 פעמים	1.80	180	12 ק"ג
עד 5 פעמים	1.95	195	13 ק"ג
עד 5 פעמים	2.10	210	14 ק"ג
עד 5 פעמים	2.25	225	15 ק"ג

טבלת גיל

במקרה שלא ידוע משקל הילד/ה:

ילדים בגילאים זהים יכולים להיות בעלי משקלים שונים באופן משמעותי, לכן יש לעשות מאמץ ולברר את משקל הילד ולקבוע מינון לפי טבלת המשקל.
רק אם אין אפשרות לברר את משקל הילד – ניתן לקבוע המינון לפי טבלת הגיל.

מספר מנות מקסימלי ליממה	מספר מיליטרים	גיל הילד
עד 5 פעמים ביום	0.40 מ"ל	בגיל 0-3 חודשים
עד 5 פעמים ביום	0.80 מ"ל	בגיל 4-11 חודשים
עד 5 פעמים ביום	1.20 מ"ל	בגיל שנה עד שנתיים
עד 5 פעמים ביום	1.60 מ"ל	בגיל 2-3 שנים
עד 5 פעמים ביום	2.40 מ"ל	בגיל 4-5 שנים

אין לעבור על המנה המומלצת אם לא חל שיפור במצבך תוך 3 ימים יש לפנות לרופא.
אם הילד/ה נטלה בטעות מנה כפולה יש להיוועץ ברופא או לפנות לחדר למיון.

שים לב:

יש להקפיד על מדידת המנה במזרק המצורף.
יש לנער היטב לפני השימוש.

אופן השימוש:

1. מצא/י את הכמות הדרושה בטבלת המינונים, בטור המציין "מספר מיליטרים".
2. מלא/י את המזרק בכמות הדרושה.
3. הזלף/י את תכולת המזרק באיטיות לפה הילד/ה, לצד הפנימי של הלחי.
4. שטוף/י את שני חלקי המזרק היטב במים פושרים וסבון.

מנעי הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל יד כך תמנע הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית החולים, והבא/י אריזת התרופה איתך.
אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: מתחת ל - 25°C.

גם לפי תנאי האריזה /אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד.
נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברופא שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מ.ס. רשום התרופה : 1346131137
יצרן: כצט תעשיות כימיות בע"מ, קרית מלאכי
משווק: כצט בע"מ, רח' החרש 4, נוד השרון