



Patient package insert in accordance with the pharmacists' regulations (preparations) - 1986
Carefully read the entire package insert before using this medication.

Nurofen Gel

Composition:

Active ingredient and its quantity: Ibuprofen 5% w/w.

Inactive ingredients: Isopropyl Alcohol, Hydroxyethylcellulose, Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxide, Purified Water.

Therapeutic group: Non steroidal anti inflammatory drugs (NSAIDs).

Therapeutic Activity:

Topical treatment for the relief of pains and non infectious inflammations such as backache, rheumatic and muscular pain, sprains, sport injuries.

When should this medicine not be used?

Do not use this medicine if you are pregnant or breastfeeding. Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients, to aspirin or other non-steroidal anti-inflammatory drugs, or if you have suffered from asthma, urticaria or rhinitis after treatment with aspirin or other non-steroidal anti-inflammatory drugs.

Do not use this drug without consulting your physician:

If you suffer or have suffered in the past from impaired function of the respiratory system (e.g. asthma), the kidney / urinary system, the gastrointestinal system (e.g. ulcer).

Warnings:

Do not use this medicine frequently, for a prolonged period, or on wide areas of skin without consulting a physician.

If you are sensitive to any type of food or medicine inform your physician before you commence using the medicine.

Refer to your physician if symptoms worsen or if there is no relief after a week of treatment.

Do not use this medicine on open wounds.

Drug Interactions:

If you are taking other medicines concomitantly, or have just completed another drug treatment, inform your physician in order to prevent hazards or inefficacy arising from drug interactions, especially for drugs of the following groups: aspirin, salicylates or other anti-inflammatory drugs.

Side Effects:

In addition to the desired effect of the drug, some side effects may appear such as: itacule redening or stinging of the skin.

Side effects requiring special attention:

Skin dryness or irritation, shortness of breath, heavy breathing, facial bruises or swelling (rare); discontinue treatment and contact your physician immediately!

When used on wide areas and for a long period, an absorption of the medicine into the blood system is possible. In this case side effects that are typical to the medicine when taken orally might appear, such as: nausea and disturbances in the gastrointestinal system, skin rash,

Информационный листок для пациента
в соответствии с правилами фармацевтики (препараты, 1986)
Перед применением лекарства внимательно прочтите всю прилагаемую информацию

ГЕЛЬ „НУРОФЕН“

Состав:

Действующее вещество и его количество: Ibuprofen 5% w/w
Дополнительные компоненты: Isopropyl Alcohol, Hydroxyethylcellulose, Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxide, Purified Water.

Терапевтическая группа: нестероидные противовоспалительные препараты (НСПВ)

Терапевтическое действие:

Местное воздействие для облегчения боли и воспаления неинфекционного характера, например боли в спине, ревматических болей, боли в мышцах, растяжения связок и спортивный травм.

Когда не следует пользоваться препаратом?

Препаратом не следует пользоваться беременным женщинам и кормящим матерям.

Препаратом не следует пользоваться при повышенной чувствительности к любому из его компонентов, к аспирину или другим нестероидным противовоспалительным средствам, а также если вы страдаете астмой, крапивницей или ринитом после лечения аспиринком или другим нестероидным противовоспалительным средством.

Перед началом пользования препаратом следует обязательно проконсультироваться с врачом:

Если вы страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы (например, астма), почек мочевого тракта, пищеварительной системы (например, язва).

Меры предосторожности:

Не следует пользоваться препаратом, часто, в течение длительного времени или на больших участках кожи, не посовествовавшись с врачом.

При повышенной чувствительности к любым пищевым продуктам или лекарственным препаратам перед началом лечения следует сообщить об этом врачу.
В случае ухудшения симптомов или отсутствия улучшения после недели лечения следует обратиться к врачу.
Не следует наносить препарат на открытые раны.

Взаимодействие с другими препаратами:
Если вы принимаете другие лекарства или недавно закончили курс лечения другим препаратом, то сообщите об этом врачу.
Таким образом вы сможете предотвратить возможный риск или снизить эффективность лечения, которые могут быть вызваны взаимодействием лекарств друг с другом. Это особенно важно в отношении аспирина, солией галлициловой кислоты и других противовоспалительных препаратов.

Побочные явления:
Кроме желаемого эффекта препарат может оказывать негативное побочное действие, например, незначительное покраснение или жжение кожи.

Побочные явления, требующие особого внимания:
Сухость или раздражение кожи, одышка, затрудненное дыхание, сыпь или отеки на лице (редкое явление); следует немедленно прекратить лечение и проконсультироваться с врачом!
При использовании препарата в течение длительного времени или

тщательно следите за состоянием кожи, одышка, затрудненное дыхание, сыпь или отеки на лице (редкое явление); следует немедленно прекратить лечение и проконсультироваться с врачом!
При использовании препарата в течение длительного времени или

нурофен гел

التركيب: المادة الفعالة وتتركبما Ibuprofen 5% w/w

المواد غير الفعالة:

Isopropyl Alcohol, Hydroxyethylcellulose, Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxide, Purified Water.

المجموعة الصيدلانية:

مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.

الفعالية الطبية:

علاج موضعي للتخفيف عن الآلام والالتهاب غير الالتهابية مثل: آلام الظهر، آلام مفاصل الالتهاب غير الالتهابية، آلام آفات المفاصل والحزجات الرياضية.

مقى مئىع استعمال المستحضر ؟

لا تستعمل الدواء إذا كانت حامل أو مرضعة.

ممنوع استعمال الدواء إذا كانت لديك حساسية معروفة لأحد مكوناته، لاستيبيد أو مستحضرات أخرى مضادة للالتهاب غير الستيروئيدية، أو إذا عانيت من الربو، الطفح أو الرشح بعد العلاج بستيبيد أو مستحضرات أخرى مضادة للالتهاب غير الستيروئيدية.

مئىع استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج: إذا كنت تعاني / إن، أو إذا عانيت سابقا، من طفح في وظيفة الجهاز التنفسي (مثل الربو)، الكلى / الجهاز البولي، جهاز الهضم (مثل القرحة).

تحذيرات:

ممنوع استعمال هذا الدواء في أوقات مقاربة للفترة من الولادة أو على مساحات واسعة من الجلد بين استشارة الطبيب.

إذا كانت لديك أية حساسية للوع من الطعام أو العقاقير، فليكن إعلام الطبيب عنها قبل استعمال الدواء.

يجب مراجعة الطبيب في حال حال تطلم الأعراض أو إذا لم يكن هناك تسهيل بعد أسبوع من العلاج.
ممنوع استعمال الدواء على جروح مفتحة.

تفاعلات مع العقاقير الأخرى:
إذا كنت تتعاطى تتعاطى دواء آخر، أو التبت مؤخرا من تعاطي دواء آخر، فليكن اخبار الطبيب المعالج، لتفادي الأضرار وعدم الحاجة للتفاعلات عن العقاقير، وبصورة خاصة فيما يتعلق بالأدوية من المضاد الأوية، الستيبيد، الساليسيلات أو مضادات أخرى للالتهاب.

العيراض الجانبية:
بالإضافة إلى العقاقير الالغوية الدواء قد تظهر أثناء استعماله التآثرات الجانبية مثل: احمرار غير شديد أو رشح في الجلد.

أعراض طرأ الاصابة بالخص:
طفح أو جفاف الجلد، حكة، تقشر، قشر، صمغ، تقشر، كدمات أو التفتاح في الوجه (نادرا)؛ توقف أي عن العلاج وتوجه أي إلى الطبيب فوراً!

علو ليعزكب لفي تكتوت الترتوتب (تتتتتت) التتتتت^{٢٠٠٢} – 1986
عش لقلرأا بعنن أتا هتلأا عد سولف لولف التتتتت بتتتتت.

נורופן ג'ל

הרכב:
התומר הפעיל וריכוזו: w/w 5% Ibuprofen

מרכיבים בלתי פעילים:
Isopropyl Alcohol, Hydroxyethylcellulose, Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxide, Purified Water.

קבוצה תרופתית:

נוגד דלקת שאינם סטרואידים.

פעילות רפואית:

טיפול מקומי להקלה בכאבים ובדלקות שאינם זיהומיות כגון: כאבי גב, כאבים ראומטיים, כאבי שרירים, נקעים, מתרחות וחבלות ספורט.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשתמש בתרופה כאשר הירג בהריון או מיניקה.
אין להשתמש בתרופה אם אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה, לאספירין או לתכשירים נוגדי דלקות אחרים שאינם סטרואידים, או אם סבלת מאסטמה, פרחה או נולת לאחר טיפול באספירין או תכשירים נוגדי דלקת אחרים שאינם סטרואידים.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:
אם הירג סובלת או סבלת בעבר מלקיז בתופקות; מערכת הנשימה (כגון אסטמה), הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול (כמו אלקזיס).

אזהרות:

שטחים רחבים במבלי להיוועץ ברופא.

אם הירג רגיש לה למחון כלשהו או להתרופה כלשהי, עלול להזדעזע על כך לרופא לפני השימוש.

יש לפנות לרופא באם התסמינים מתרופים או באם אין הקלה לאחר טיפול בשךר שבוע ימים.

אין להשתמש בתרופה זו על פצעים פתוחים.

תגובות בין תרופתיות:

אם הירג נטלת תרופה נוספת, או אם טימתה זה עתה טיפול בתרופה אחרת עלול לדחות לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות תרופתית.
בין תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: אספירין, סליצילטים ותכשירים נוגדי דלקת אחרים.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון: איזומויות לא חרופה או עקיצוץ בעור.

תופעות תרופתיות התרחקות מיוחדות:

אם הירג או יובש בעור, גירוד, נשימות כבדות, קוצר נשימה, תבורות פריחה או יובש בעור, גירוד, נשימות כבדות, קוצר נשימה, תבורות או נפחות בגנים (נדיח): יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא מדי



