

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה
פורמט עלון זה נקבע על-ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו באפריל 2012

רניס® אייס
טבליות לעיסה

הרכב:
כל טבליה מכילה:

Calcium carbonate 680 mg (272 מ"ג סידן זמין)
Heavy magnesium carbonate 80 mg

חומרים בלתי פעילים:
Sucrose, Talc, Xylitab 100, Pregelatinised maize starch, Cooling flavour, Mint flavour,
Potato starch, Magnesium stearate, Light liquid paraffin.

קבוצה תרפויטית: סותר חומצה.

פעילות רפואית:
התכשיר נוגד חומציות יתר בקיבה, כל טבליה סותרת כ-16 mEq של חומצה.
התרופה מיועדת להקלה במצבים של חומציות יתר וצרבת.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש במקרה של מחלת כליות חמורה.
אין להשתמש במקרה של רמות סידן גבוהות בשתן או אבנים בכליות.
אין להשתמש במקרה של רמות סידן גבוהות או רמות פוספט נמוכות בדם.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:
אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכליה/ מערכת השתן.

אזהרות:

אם הינך בהריון או מניקה, רצוי להיוועץ ברופא (פנה/י לסעיף "מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא").
בתקופת טיפול ממושך בתרופה זו רצוי לערוך בדיקות רמת סידן, מגנזיום ופוספט בדם, בייחוד בחולים הסובלים מאי ספיקת כליות.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
אין להשתמש בתרופה זו במשך יותר משבועיים אלא בעצת רופאך.
אם התסמינים ממשיכים מעל 14 ימים מנטילת התרופה, פנה/י לרופא.
התרופה מכילה סוכרוז. אם נאמר לך ע"י רופא כי הנך סובל/ת מרגישות לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת רני אייס.
תרופה זו אינה מומלצת לילדים מתחת לגיל 12 שנים.

תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תכשירים המכילים ברזל או פוספט, תרופות אנטיביוטיות ממשפחת

הטטרציקלינים או הקוויןולונים, דיגוקסין (לטיפול בלב), תרופות ממשפחת התיאזידים (משתנים), פלואורידים (למניעת עששת).

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

במינונים המומלצים תופעות לוואי אינן סבירות. תופעות אלרגיות כגון: פריחה, גרד, קשיי נשימה והתנפחות של הפנים, הפה או הגרון, שוק אנפילקטי (תסמינים אפשריים: לחץ דם נמוך, דפיקות לב, קשיי נשימה, התכווצות סימפונות הנשימה, תגובות עוריות, כאבי בטן או התכווצויות, הקאות ושלשול) - נדיר, הפסק/י טיפול ופנה/י מיד לרופא. בשימוש ממושך במינונים גבוהים של התרופה, בייחוד אצל חולים הסובלים מבעיות בתפקוד הכליות, עלולה להיגרם עלייה ברמות הסיידן/ המגנזיום בדם, אשר יכולה להתבטא בתסמינים הבאים: בחילות, הקאות, קלקול קיבה, שלשול, עייפות, חולשת שרירים, כאב ראש, הפרעות בכליות ושיבוש בחוש הטעם- הפסק/י טיפול ופנה/י לרופא מיד. במקרים חריגים, שימוש ממושך במינונים גבוהים עלול לגרום לתסמונת "מילק- אלקלי" המתבטאת ברמות גבוהות של סידן בדם ושללא טיפול יכולה להוביל להסתיידויות ולאי ספיקת כליות. הפסק/י טיפול ופנה/י לרופא מיד. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

1-2 טבליות, עדיף כשעה לאחר האוכל ולפני השינה. לטיפול בצרכת ניתן ליטול 2 טבליות בנוסף לזמנים הללו עד למקסימום של 10 טבליות בתקופה של 24 שעות (יממה). אין ליטול מעל 10 טבליות ביממה. ניתן לשימוש גם לנשים הרות ומניקות במינון המקובל. רצוי להיוועץ קודם ברופא. אין לעבור על המנה המומלצת. אם נטלת בטעות מנה כפולה, הקפד/י על שתייה מרובה ופנה/י לרופא. תרופה זו אינה מיועדת בדרך- כלל לילדים מתחת לגיל 12 שנים.

שים/י לב:

מומלץ להמתין כשעה-שעתיים בין נטילת תרופות אחרות לנטילת רני אייס.

אופן השימוש:

יש ליטול התרופה כשעה לאחר ארוחה ולפני השינה. יש ללעוס או למצוץ את התרופה לפני בליעתה.

מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור, מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחד מיון של בית חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא! אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה:

מתחת ל- 25°C.

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 147 91 33516 00

יצרן: דלפארם גאייר, גאייר, צרפת.

בעל הרישום: באייר ישראל בע"מ, רח' החרש 36, הוד השרון 45240.