

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
קרא/י בעיון את את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידו

שם התכשיר: סליפ אייד טבליות

הרכב:

Doxylamine succinate 25mg
חומרים בלתי פעילים:

Microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate anhydrous, dibasic calcium phosphate, sodium starch glycolate, magnesium stearate, FD&C blue#1 aluminium lake.

התוויה:

התרופה מיועדת כעזר לשינה.

מתי אין להשתמש בתרופה?

אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון או מניקה.
אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש במצבים של אסתמה, גלאוקומה, הגדלת הפרוסטטה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד: מערכת הנשימה (כגון אסתמה), הלב ו/או כלי דם, עיניים (כגון גלאוקומה), הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול (כגון אולקוס), בלוטת התריס (תירואיד), בלוטת הערמונית.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

אין לשנות ינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.

אזהרות:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות ומעבר לשבועיים בלי להיוועץ ברופא!

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. יש ליטול טבליות סליפ אייד רק לפני השינה. השימוש בתרופה פוגם בעירנות ולכן אין לבצע כל פעילות המחייבת עירנות לאחר נטילת התרופה!

תגובות בין-תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות להרגעה, לשינה, לפרקינסון, נגד אלרגיות, חומרים מרדמים לניתוחים ומשככי כאבים נרקוטיים), תרופות נגד דיכאון, תרופות אנטיכולינרגיות או בעלות פעילות אנטיכולינרגית (כגון תכשירים נגד עוויתות בטן).

תופעות לוואי:
בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, כגון:
יובש בפה, טשטוש ראייה.
תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:
חום, כאב גרון (נדיר): הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא.
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשה הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:
למבוגרים ולילדים מעל גיל 12: טבליה אחת חצי שעה לפני השינה.
אין לקחת לתקופה של יותר משבועיים רצופים אלא רק באישור הרופא.
אין לעבור על המנה המומלצת.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות ולילדים מתחת לגיל 12.

אופן השימוש:
אין ללעוס! יש לבלוע את התרופה עם מים.

מנע/י הרעלה!
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים והבא/י אריזת התרופה איתך.
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק את התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה.
יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה:
בטמפרטורת החדר 15°C-30°C.
גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 13107.30938

היצרן: חברת פריגו, ארה"ב.

בעל הרישום: אגיס סוכנויות מסחריות (1989) בע"מ, רח' לח"י 29 בני-ברק 51200