

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה:
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר באפריל 2011

שם התכשיר וצורתו: טיפטיפות סימיקול טיפות

הרכב: החומר(ים) הפעיל(ים) וכמותם וריכוזם: Simethicone 40mg/0.6ml
כמות הנתרן בכל 1 מ"ל: 0.875 מ"ג

מכיל גם:

Polysorbate 80, Sorbitan Monostearate 60, Microcrystalline cellulose,
Strawberry Flavour, Citric acid (anhydrous), Sodium Benzoate, Sodium
Citrate, Xanthan Gum, Saccharin sodium, Purified Water.

קבוצה תרפויטית: תרופות להקלה בגזים במערכת העיכול.

פעילות רפואית: תכשיר נגד גזים

התוויות: התרופה מיועדת להקלה על כאבי בטן אצל תינוקות וילדים קטנים הנגרמים כתוצאה מהצטברות גזים.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה

אזהרות:

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תגובות בין תרופתיות:

אם הילד/ה נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי. בכל מקרה שבו הילד/ה מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשה הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי שהתפתחה לאחר מתן התכשיר וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא

0.3 מ"ל (20 מ"ג) לפני כל ארוחה. ניתן להעלות המינון ל – 0.6 מ"ל (40 מ"ג) במידת הצורך.

אין לעבור על 12 מנות של 0.3 מ"ל או 6 מנות של 0.6 מ"ל (סה"כ 240 מ"ג) ליום. בתקופת הטיפול בתרופה רצוי להיוועץ ברופא לצורך אבחון הגורם להצטברות הגזים.

אופן השימוש:

יש למלא את המזרק המצורף עד למידה הרצויה ולטפטף לפה. לאחר השימוש יש להפריד בין חלקי המזרק, לשטוף במים פושרים וסבון ולייבש.

מנע הרעלה !

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל יד כך תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית החולים, והבא אריזת התרופה איתך.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא !

אין ליטול תרופה בחושך ! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל התרופה. הרכבי/ משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: מתחת ל - 25°C

לשימוש עד חודש ימים מיום הפתיחה.

גם לפי תנאי האריזה /אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס. רשום התרופה 533826579

יצרן: כצט תעשיות כימיות בע"מ כתובת: קרית מלאכי
משוק: כצט בע"מ, רח' החרש 4, הוד השרון