

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו ביוני 2007

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

1. שם התכשיר וצורתו: **זובירקס קרם**
שפורפרת או משאבה
2. הרכב: החומרים הפעילים וכמותם/ריכוזם:

Acyclovir 5% w/w

חומרים בלתי פעילים:

Dimethicone, Propylene Glycol, Poloxamer 407, Cetostearyl Alcohol, Sodium Lauryl Sulphate, White Soft Paraffin, Liquid Paraffin, Purified Water

3. פעילות רפואית:

אנטיויראלי כנגד הוירוס הרפס סימפלקס / לביאליס

4. התרופה מיועדת ל:

התרופה מיועדת לטיפול בפצעי קור הנגרמים ע"י הרפס סימפלקס/לביאליס.

5. מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש בתכשיר אם ידועה לך רגישות לאציקלוביר, ואלציקלוביר, פרופילן גליקול או לכל אחד מהמרכיבים של זובירקס קרם.
אין להשתמש בתכשיר באזור העיניים או אברי המין
אין להשתמש בתכשיר אם הנך סובל/ת מירידה בפעילות המערכת החיסונית

6. אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון, מתכננת הריון או מיניקה

7. אזהרות:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
התכשיר אינו מיועד לעיניים, אי לכך הרחק ממגע עם עיניים.
במקרה של מגע עם עיניים, יש לשטוף היטב ומיד עם מים.
התכשיר אינו מיועד למריחה בתוך הפה.
יש להתייעץ עם הרופא אם הינך סובל מ הרפס סימפלקס חוזר ונשנה בצורה חמורה או אם חלה החמרה במחלה הקיימת.

8. תגובות בין-תרופתיות:

אם הנך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד אם הינך משתמש/ת בתכשירים אחרים לשימוש חיצוני.

9. תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: כאב קל או צריבה לאחר המריחה. תופעה זו חולפת תוך זמן קצר. אדמומיות, עקצוץ, יובש או קילוף של העור.

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

תגובה אלרגית: התנפחות, במיוחד של השפתיים פנים או עפעפיים, פריחה או חבורה בעור, נדיר: הפסק הטיפול ופנה לרופא מיד!

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

10. תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה! ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

11. מינון מקובל:

חשוב מאוד להתחיל בטיפול מוקדם ככל האפשר עם הופעת הסימנים מקדימים כגון: גירוי ועקצוץ באזור השפתיים. יש לשטוף את הידיים לפני ולאחר מריחת הקרם. יש למרוח כמות קרם המספיקה לכיסוי כל האזור הנגוע באזור שפה, 5 פעמים ביום (במרווחים של 4 שעות) במשך 5 ימים. אם שכחת למרוח תרופה זו בזמן קצוב יש למרוח מיד כשזוכרת ולהמשיך את הטיפול הבא בשעה היעודה. אין לעבור על המנה המומלצת אם לא חל שיפור במצבך תוך 5 ימים, ניתן להמשיך את הטיפול עוד 5 ימים נוספים. אם ריפוי מלא לא התרחש לאחר 10 ימים או חלה החמרה התייעץ עם הרופא.

12. שים לב:

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. יש להימנע ממגע עם עיניים על מנת למנוע הדבקת אחרים, או העברת הזיהום לחלקים אחרים בגוף, בזמן הופעת פצע ההרפס עליך להימנע משימוש משותף במגבת או כלי אוכל, להימנע מכל מגע פיזי (כגון נשיקות וקיום יחסי מין אוראליים) לרחוץ היטב את הידיים לפני ואחרי נגיעה בפצע.

13. מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.

אל תגרורם להקאה ללא ההוראה מפורשת מרופא!

14. אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטלת תרופה. הרכבי/ משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

15. אחסנה:

במקום קריר ויבש לא במקרר גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד.

נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה : 126-38-30532

כתובת : אנגליה.

יצרן : Glaxo Operations Limited

כתובת : בזל 25, פתח-תיקוה 49002

בעל הרישום : גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ